

TONOVITAN®

Suplemento multivitamínico

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada 5 ml del jarabe contienen:

Sulfato ferroso	135 mg
(equivalentes a 27 mg de hierro elemental)	
Ácido ascórbico (vitamina C)	25 mg
Clorhidrato de tiamina (Vitamina B ₁)	1,5 mg
Fosfato de riboflavina (Vitamina B ₂)	1,25 mg
Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B ₆).....	1 mg
Cianocobalamina	3 mcg
Nicotinamida	10 mg
Ácido fólico	0,05 mg

Excipientes: sorbitol, alcohol etílico, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, esencia de coco, esencia de vainilla, sacarosa, hidróxido de sodio, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Suplemento de vitaminas y minerales

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

TONOVITAN® contiene una combinación de hierro y vitaminas hidrosolubles, indicado como suplemento nutricional para la prevención y el tratamiento de la anemia ferropénica y las deficiencias de vitamina C y vitaminas del complejo B, especialmente en niños y jóvenes en crecimiento, mujeres embarazadas o dando de lactar, personas expuestas a actividad física extenuante, pérdidas excesivas de sangre durante la menstruación, pacientes con desnutrición, pacientes con enfermedades crónicas y otras condiciones que requieran un aumento de la ingesta diaria de hierro, vitamina C y vitaminas del complejo B.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de usar este medicamento informe a su médico acerca de cualquier alergia o problema médico que usted tenga o haya tenido, especialmente diabetes, úlceras pépticas y colitis u otros problemas digestivos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando.

Los antiácidos, los antihistamínicos H₂ como la ranitidina y los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol pueden disminuir la absorción de los suplementos de hierro.

Los suplementos de hierro pueden interferir con la absorción de los bifosfonatos como el alendronato, de los antibióticos quinolónicos como la ciprofloxacina y de las tetraciclinas. Tome la dosis de TONOVITAN® por lo menos 2 horas antes o 2 horas después de tomar cualquier antibiótico.

EFFECTOS ADVERSOS

En algunas ocasiones, el uso de suplementos de hierro se puede acompañar de molestias tales como estreñimiento, heces oscuras, dolor abdominal, náuseas o vómitos. Si éstas o cualquier otra molestia no desaparecen o empeoran con el paso de los días, comuníquelo a su médico.

DOSIS USUAL

En general, para la prevención de la anemia por falta de hierro, la dosis recomendada es de una cucharadita una vez al día.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

CONSEJOS DE USO

TONOVITAN® se toma de preferencia con el estómago vacío, pero si usted siente molestias abdominales puede tomar la dosis junto con los alimentos. Evite tomar este medicamento con productos lácteos, café, té o cereales.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

PRESENTACIONES

TONOVITAN® Jarabe, frasco por 120 ml
TONOVITAN® Jarabe, frasco por 240 ml

Venta Libre

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. de las Américas N° 100 y Calle 7ª
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Mayo del 2016



www.rocnarf.com