

# ALBENDAZOL

*Tabletas masticables de 400 mg,  
Suspensión de 400 mg/20 ml*

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

## COMPOSICIÓN:

### ALBENDAZOL Tabletas masticables

Cada tableta contiene 400 mg de albendazol.

Excipientes: Sacarosa, Celulosa microcristalina, estearato de magnesio, aspartame, sabor naranja, sabor fresa, colorante rojo.

### ALBENDAZOL Suspensión

Cada 20 ml contienen 400 mg de albendazol.

Excipientes: benzoato de sodio, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, glicerina, goma xanthan, sacarina sódica, esencia de fresa, esencia de vainilla, color rojo FD&C 40, ácido cítrico, agua purificada.

## GRUPO TERAPÉUTICO

Antihelmíntico de amplio espectro.

## DESCRIPCIÓN

El albendazol es un medicamento perteneciente a la clase de los antihelmínticos benzimidazólicos, activo contra una amplia variedad de especies de parásitos helmintos, tanto en niños como en adultos.

Las propiedades químicas del albendazol permiten el tratamiento de la mayoría de las helmintiasis con una sola dosis, lo que facilita el cumplimiento de la terapia.

## INDICACIONES Y DOSIS

En niños mayores de 2 años y adultos, para las parasitosis intestinales, las indicaciones y dosis recomendadas son las siguientes:

Infestaciones intestinales por *Ascaris lumbricoides*, *Necator americanus*, *Enterobius vermicularis*, *Trichuris trichiura*: una sola dosis de 400 mg de albendazol (una tableta o todo el contenido de un frasco de la suspensión).

En el caso de la parasitosis por enterobios (oxiuros) se recomienda en ciertos casos tratar a toda la familia y repetir la dosis a las tres semanas, para interrumpir el ciclo de vida del parásito y evitar la reinfestación.

Infestaciones intestinales por *Strongyloides stercoralis*, Tenias o *Hymenolepis nana*: 400 mg de albendazol una vez al día por tres días.

## CONTRAINDICACIONES

Este medicamento no puede ser usado por personas alérgicas al albendazol o a cualquier otro agente benzimidazólico, tales como el mebendazol o el flubendazol.

No tome este medicamento si usted está embarazada o sospecha estarlo.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuníquese a su médico sobre cualquier otro medicamento que usted esté recibiendo, especialmente dexametasona, teofilina y otros antiparasitarios.

## **ADVERTENCIAS**

Antes de iniciar el tratamiento con albendazol informe a su médico acerca de cualquier problema de salud que usted tenga, especialmente anemia u otras enfermedades de la sangre, disfunción hepática o problemas biliares, y antecedentes de convulsiones.

No se recomienda ingerir alcohol durante el tratamiento, ya que puede aumentar el riesgo de daño hepático.

### **Uso en el embarazo y lactancia:**

El albendazol no está indicado para mujeres embarazadas o en sospecha de estarlo. Se recomienda que las mujeres en edad de concebir realicen el tratamiento durante los primeros siete días del ciclo menstrual, y tomen las medidas anticonceptivas necesarias durante un mes luego del tratamiento.

No se recomienda administrar albendazol durante la lactancia, salvo casos muy especiales en los que los beneficios esperados sean mayores que los riesgos potenciales.

## **EFFECTOS ADVERSOS**

En general, el albendazol suele ser bien tolerado. En raras ocasiones puede presentarse efectos secundarios tales como dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarreas, cefaleas, vértigos, erupciones en la piel o alteraciones del gusto.

Si alguna de estas molestias se mantiene o empeora con el paso de los días, comuníquelo a su médico. En caso de presentar síntomas o signos de alergia, tales como ronchas en la piel o hinchazón de la cara, suspenda el tratamiento y acuda al centro de salud más cercano.

## **SOBREDOSIS**

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. Una sobredosis con albendazol puede producir diarrea, náuseas, dolor abdominal y taquicardia, entre otros síntomas.

## **CONSEJOS DE USO**

Tome la dosis de albendazol junto con los alimentos, de preferencia con comidas ricas en grasas. La tableta puede deglutirse entera o partirse y masticarse.

## **ALMACENAMIENTO**

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**Vía de administración: Oral**

## **PRESENTACIONES**

Albendazol tabletas de 400 mg, Caja x 30 tabletas y caja x 1 tableta.  
Albendazol suspensión de 400 mg, frasco x 20 ml

**Venta Bajo Receta Médica**

**Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca marengo Km 5½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Junio 2021.



# **Rocnarf**

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

**[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)**