

# AMBROXOL

## Jarabe

### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

### COMPOSICIÓN:

#### **Ambroxol 15 mg/ 5ml**

Cada 5 ml del jarabe contienen 15 mg de clorhidrato de ambroxol.

#### **Ambroxol 30 mg/5 ml**

Cada 5 ml del jarabe contienen 30 mg de clorhidrato de ambroxol.

Excipientes: fosfato de sodio, ácido cítrico anhidro, aspartamo, glicerina, propilenglicol, sorbitol, metilparabeno, alcohol etílico, esencia de vainilla, agua purificada.

### GRUPO TERAPÉUTICO

Mucolítico y expectorante.

### DESCRIPCIÓN

El ambroxol es un medicamento que tiene la propiedad de estimular la secreción de un moco respiratorio más abundante y fluido, facilitando su eliminación por medio de la tos.

### INDICACIONES

El ambroxol está indicado como coadyuvante en el tratamiento de la bronquitis aguda, traqueobronquitis, bronquitis crónica, asma bronquial, enfisema y otras condiciones caracterizada por la presencia de tos seca y moco respiratorio espeso y de difícil expectoración. Su médico puede recetarle ambroxol para indicaciones no incluidas en esta guía.

### CONTRAINDICACIONES

No use este medicamento si usted tiene antecedentes de alergia al ambroxol o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Contiene aspartamo. Contraindicado en pacientes con fenilcetonuria.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de usar este medicamento comunique a su médico acerca de cualquier alergia o cualquier problema médico que usted haya tenido, especialmente úlcera gástrica.

Informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar. El ambroxol debe administrarse con precaución durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. No se recomienda su administración durante la lactancia.

## **EFECTOS ADVERSOS**

El ambroxol suele ser muy bien tolerado. En raras ocasiones pueden producirse molestias digestivas tales como dolor abdominal, náuseas o diarreas, que por lo general tienden a ser leves y de corta duración. Si estas o alguna otra molestia empeora o no cede con el paso de los días, comuníquelo a su médico.

## **INTERACCIONES FARMACOLOGICAS**

Informe a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, incluso aquellos que no requieran receta médica.

## **DOSIS USUAL**

Su médico le indicará la dosis adecuada para su caso y el tiempo del tratamiento. En general, las dosis recomendadas son las siguientes:

### ***Ambroxol jarabe 15 mg/5 ml***

- Niños menores de 2 años: 2,5 ml (media cucharadita) dos veces al día.
- Niños de 2 a 5 años; 2,5 ml (media cucharadita) tres veces al día.
- Niños de 6 a 12 años: 5 ml (una cucharadita) tres veces al día.

### ***Ambroxol jarabe 30 mg/5 ml***

- Niños de 6 a 12 años: 2,5 ml (media cucharadita) tres veces al día.
- Adultos y mayores de 12 años: 5 ml (una cucharadita) tres veces al día.

## **SOBREDOSIS**

En caso de una sobredosis con este medicamento acuda al centro de salud más cercano.

## **ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**Vía de administración:** Oral

## **PRESENTACIONES**

Ambroxol 15 mg/5 ml jarabe, frasco por 120 ml.

Ambroxol 30 mg/5 ml jarabe, frasco por 120 ml.

**Venta por Receta Médica.**

**Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este  
Prospecto: Junio del 2021

