

AMOXICILINA

Cápsulas de 500 mg, tabletas de 1 g
Polvo para suspensión de: 250 mg/5 ml

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico o farmacéutico.

COMPOSICIÓN:

Amoxicilina cápsulas de 500 mg

Principio Activo: cada cápsula contiene amoxicilina trihidrato equivalente a 500 mg de amoxicilina base.

Amoxicilina tabletas de 1 g

Principio Activo: cada tableta contiene amoxicilina trihidrato equivalente a 1000 mg de amoxicilina base.

Excipientes: Almidón glicolato de sodio, celulosa microcristalina, almidón pregelatinizado, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, opadry blanco, alcoholético.

Amoxicilina polvo para suspensión de 250 mg/5 ml

Principio Activo: cada 5 ml de la suspensión reconstituida contiene amoxicilina trihidrato equivalente a 250 mg de amoxicilina base.

Excipientes: Benzoato de sodio, lactosa monohidrato, citrato de sodio, carboximetilcelulosa, sacarina sodica, esencia cereza, color rojo, polisorbato.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antibiótico betalactámico.

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES.

La AMOXICILINA es un antibiótico betalactámico indicado para el tratamiento de ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo amigdalitis, faringitis, otitis media, infecciones urinarias, infecciones de la piel y otras. En conjunto con otros antibióticos y otros medicamentos, la AMOXICILINA es además utilizada para el tratamiento de las úlceras del estómago causadas por la infección por la bacteria *Helicobacter pylori*. Su médico puede prescribirle AMOXICILINA para indicaciones que no se incluyen en esta guía.

DOSIS

La dosis y la duración del tratamiento dependen de la infección específica y del criterio de su médico.

- En niños de 4 semanas a 3 meses de edad, la dosis ponderal es de 20 a 30 mg/kg /día, en dosis divididas cada 12 horas, por el tiempo que el médico indique.
- En niños de 4 meses a 12 años, la dosis ponderal es de 20 a 50 mg/kg/día, en dosis divididas cada 8 a 12 horas, por el tiempo que el médico indique.
- En adultos y jóvenes mayores de 12 años, la dosis usual en la mayoría de las indicaciones es de una cápsula de 500 mg cada 8 horas o una tableta de 1 g cada 12 horas por 10 a 14 días.

CONTRAINDICACIONES

No utilice este producto si usted ha tenido reacciones alérgicas a la amoxicilina o a cualquier otro antibiótico betalactámico, incluyendo penicilina, ampicilina y dicloxacilina.

ADVERTENCIAS

Antes de comenzar el tratamiento con amoxicilina, informe a su médico si usted ha tenido alergias a antibióticos del grupo de las cefalosporinas, o si usted tiene algún otro problema médico, especialmente asma, enfermedades del hígado o del riñón, enfermedades de la coagulación de la sangre, mononucleosis y cualquier tipo de alergia a alimentos o medicinas.

Tome este medicamento por todo el tiempo que indicó su médico, incluso si sus síntomas han desaparecido antes de terminar el tratamiento.

Los antibióticos pueden causar diarrea, que en ciertos casos puede ser signo de otra infección. Si usted experimenta diarrea acuosa o sanguinolenta durante el tratamiento con amoxicilina o cualquier otro antibiótico, suspenda de inmediato el tratamiento y acuda a su médico.

La amoxicilina no se debe utilizar para el tratamiento del resfriado u otras infecciones virales.

Uso durante el embarazo o la lactancia: La AMOXICILINA puede ser administrada durante el embarazo y la lactancia, pero siempre por prescripción y bajo vigilancia médica. Informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar antes de tomar AMOXICILINA.

EFFECTOS ADVERSOS

En general, la AMOXICILINA suele ser muy bien tolerada. En ciertas ocasiones puede haber molestias tales como dolor abdominal, diarrea, náuseas, dolores de cabeza e irritación o secreción vaginal. Si alguna de estas molestias no desaparece con el paso de los días o empeora, póngase en contacto con su médico.

Acuda de inmediato a su médico si durante el tratamiento con AMOXICILINA usted presenta diarrea acuosa o con sangre, signos de alergia (incluyendo ronchas en la piel, dificultad para respirar, hinchamiento de la cara, labios, lengua o garganta), fiebre, tos, debilidad, erupciones en la piel o cualquier otra molestia.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis por AMOXICILINA se incluyen confusión, cambios en la conducta, erupciones en la piel, cambio en la coloración de la orina y convulsiones.

CONSEJOS DE USO

Tome este medicamento tal como le indicó su médico, a las mismas horas todos los días y durante todo el tiempo indicado de tratamiento, aun si usted ya se siente libre de síntomas.

No comparta este medicamento con nadie, incluso si tiene los mismos síntomas que usted.

Si usted se olvida de tomar una dosis, tómela tan pronto se acuerde. Si es casi la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada ni tome una cantidad mayor de lo indicado.

La suspensión de AMOXICILINA debe prepararse agregando agua fría previamente hervida, hasta la marca indicada en el envase. Agitar bien después de reconstituir. Después de preparada la suspensión de AMOXICILINA, ésta puede conservarse por 7 días a temperatura ambiente o 10 días en el refrigerador. Agite la suspensión antes de cada uso.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

PRESENTACIONES:

Amoxicilina, caja x 30 cápsulas de 500 mg

Amoxicilina, caja x 30 tabletas de 1 g

Amoxicilina, frasco para 100ml y 60ml polvo para suspensión oral.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanka Marengo Km 5½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto: Junio 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com