

ATORVASTATINA

LIPOCOL®

Tabletas Recubiertas de 20 mg y 40 mg

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta recubierta contiene atorvastatina cálcica equivalente a 20 mg de atorvastatina.

Excipientes: carbonato de calcio, celulosa microcristalina PH 102, lactosa monohidrato, hidroxietilcelulosa, polisorbato 80, simeticona emulsión, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

Cubierta: Opadry Naranja, Opadry Blanco, Polietilenglicol 1450, Alcohol etílico*.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

Cada tableta recubierta contiene atorvastatina cálcica equivalente a 40 mg de atorvastatina.

Excipientes: carbonato de calcio, celulosa microcristalina PH 102, lactosa monohidrato, hidroxietilcelulosa, polisorbato 80, simeticona emulsión, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

Cubierta: Opadry Naranja, Polietilenglicol 6000, Alcohol etílico*.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

GRUPO TERAPÉUTICO

Hipolipemiente.

del hígado, o está embarazada o dando de lactar.

DESCRIPCIÓN

La atorvastatina es un medicamento perteneciente al grupo de los llamados inhibidores de la HMG-coenzima A reductasa, también conocidos como "estatinas". La atorvastatina actúa disminuyendo los niveles de colesterol LDL (llamado colesterol "malo") y triglicéridos, y aumentando los niveles de colesterol HDL (o colesterol "bueno") en la sangre.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de usar este medicamento informe a su médico acerca de cualquier alergia o condición médica que usted tenga o haya tenido, especialmente enfermedades del hígado, debilidad o dolores musculares, o enfermedades de la tiroides o los riñones. Informe también a su médico si usted bebe más de dos bebidas alcohólicas al día. El alcohol puede aumentar el riesgo de efectos adversos graves durante el tratamiento con atorvastatina.

INDICACIONES

La atorvastatina está indicada para reducir los niveles de colesterol total en la sangre y para disminuir el riesgo de infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria, riesgo de sufrir de enfermedad coronaria o diabetes tipo 2.

Para obtener los mejores resultados, la terapia con atorvastatina debe formar parte de un programa completo de tratamiento que incluya también una dieta apropiada, ejercicio y control del peso, de acuerdo con las instrucciones de su médico.

Uso durante el embarazo y la lactancia: La atorvastatina no debe ser administrada durante el embarazo ya que podría causar daños al feto, ni tampoco durante la lactancia. Si usted se embaraza mientras está en tratamiento con atorvastatina, debe suspender el tratamiento de inmediato.

CONTRAINDICACIONES

No tome este medicamento si usted ha tenido alergia a la atorvastatina, tiene enfermedades

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe a su médico acerca de cualquier otro medicamento, suplementos vitamínicos o productos naturales que usted esté tomando, especialmente ketoconazol u otros antimicóticos, claritromicina, colchicina, digoxina, anticonceptivos orales, fenofibrato, gemfibrozil, niacina, fármacos antivirales, ciclosporina, rifampicina y espironolactona.

EFFECTOS ADVERSOS

En algunas ocasiones el tratamiento con atorvastatina se puede acompañar de molestias tales como diarrea, acidez estomacal, exceso de gases, dolores articulares, problemas de memoria y confusión. Si alguno de estos síntomas empeora o se mantiene en el tiempo, infórmelo a su médico.

Comuníquese de inmediato con su médico si durante el tratamiento con este producto usted experimenta dolores o debilidad muscular, falta de energía, fiebre, dolor en el pecho, náuseas, debilidad o cualquier otra reacción rara o inusual.

DOSIS USUAL

Su médico le indicará la dosis y el tiempo de tratamiento adecuados para su caso. En general, las dosis recomendada de inicio es de 10 a 20 mg una vez al día. La dosis de mantenimiento puede fluctuar entre 10 y 80 mg una vez al día. La atorvastatina puede administrarse en una sola toma diaria, con o sin las comidas.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

CONSEJOS DE USO

Consuma una dieta baja en grasa y en colesterol y siga todas las recomendaciones de su médico con respecto al ejercicio y la alimentación. Evite tomar grandes cantidades de jugo de toronja y limite el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento con este medicamento.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración oral

PRESENTACIONES

Atorvastatina / Lipocol, Tabletas Recubiertas de 20 mg, caja x 12

Atorvastatina / Lipocol, Tabletas Recubiertas de 40 mg, caja x 12

Venta Bajo Receta Médica.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Julio del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com