

# ***Beneuril***<sup>®</sup> **300**

*Tiamina (vitamina B1)*

*Tabletas de 300 mg*

## **INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

## **COMPOSICIÓN**

**Cada tableta contiene:**

Clorhidrato de tiamina (vitamina B1).....300 mg

Excipientes: Lactosa, almidón, estearato de magnesio, almidón pregelatinizado, dióxido de silicio coloidal.

## **GRUPO TERAPÉUTICO**

Vitaminas del Complejo B

## **DESCRIPCIÓN**

**BENEURIL**<sup>®</sup> contiene como principio activo al clorhidrato de tiamina, o vitamina B1, una vitamina hidrosoluble que forma parte de las vitaminas del complejo B.

## **INDICACIONES**

**BENEURIL**<sup>®</sup> está indicado para la prevención y el tratamiento de la deficiencia de tiamina, o beri beri, causada por ejemplo por factores como deficiencias nutricionales, dietas especiales o alcoholismo. Prevención del síndrome de Wernicke-Korsakoff en el paciente alcohólico.

Su médico puede también haberle recetado **BENEURIL**<sup>®</sup> para otras condiciones caracterizadas por lesiones de los nervios periféricos y dolor neuropático, incluyendo polineuritis alcohólica, neuritis del embarazo, neuralgia postherpética o neuropatía diabética, en las cuales la ingesta de suplementos de tiamina puede ayudar al alivio del dolor y a una recuperación más rápida de la integridad funcional.

## **CONTRAINDICACIONES**

No use este producto si usted ha tenido reacciones alérgicas a alguno de los componentes de la fórmula.

## **PRECAUCIONES**

**BENEURIL®** está indicado para pacientes mayores de 12 años de edad. No administre este producto a niños a menos que lo indique su médico.

Si usted está embarazada, consulte con su médico antes de tomar **BENEURIL®**.

## **EFFECTOS ADVERSOS**

**BENEURIL®** suele ser muy bien tolerado, y su administración raramente se acompaña de efectos adversos.

## **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**

La dosis y el tiempo de tratamiento dependen de su condición específica y el criterio de su médico.

En la mayoría de las ocasiones, la dosis usualmente recomendada de **BENEURIL®** es de una tableta de 300 mg una vez al día.

## **VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VÍA ORAL**

## **SOBREDOSIS**

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

## **ALMACENAMIENTO**

Conservar a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

## **PRESENTACIÓN**

**BENEURIL®** tabletas de 300 mg, caja por 30 Tabletas.

Venta Bajo Receta Médica

## **Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión del  
Prospecto: Julio del 2021



# **Rocnarf**

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)