

# Bilidren® Enzimático

*Ácido dehidrocólico, pancreatina, simeticona*

*Tabletas recubiertas*

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento, ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico o farmacéutico.

## COMPOSICIÓN:

### **Bilidren Enzimático Tabletas recubiertas**

Cada tableta recubierta contiene 150 mg de ácido dehidrocólico, 170 mg de pancreatina y 40 mg de simeticona.

Excipiente: Croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa micricristalina, pH 200, almidón pregelatinizado, Dioxido de silicio, alcohol etílico, opadry enterico amarillo, opadry amarillo, sucralosa.

## GRUPO TERAPÉUTICO

Hidrocolerético y digestivo

## DESCRIPCIÓN

Bilidren contiene ácido dehidrocólico, una sustancia que estimula la formación de una bilis más fluída por parte del hígado, lo que facilita su paso desde la vesícula biliar al intestino delgado.

Bilidren Enzimático contiene, adicionalmente al ácido dehidrocólico, pancreatina y simeticona, sustancias que ayudan en la digestión de los alimentos y en el alivio de las molestias causadas por exceso de gases, respectivamente.

## INDICACIONES

Tratamiento de la dispepsia, la distensión abdominal, la flatulencia y otras molestias digestivas causadas por la ingesta de comidas abundantes en grasas. Terapia de apoyo en el tratamiento de la insuficiencia pancreática, las disquinesias biliares, la esteatorrea, la colelitiasis asintomática y la intolerancia a las grasas posterior a la

colecistectomía.

## CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de reacciones alérgicas a cualquiera de sus componentes, estenosis completa de las vías biliares, insuficiencia hepática avanzada.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Comuníquese a su médico acerca de cualquier alergia o cualquier problema de salud que usted tenga o haya tenido, especialmente enfermedades del hígado y las vías biliares.

### **Uso durante el embarazo y la lactancia:**

Informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar. El uso de Bilidren y Bilidren Enzimático durante el embarazo y la lactancia debe darse únicamente por prescripción y bajo vigilancia médica.

**Uso en pediatría:** No administrar estos medicamentos a menores de 12 años menos que su médico lo indique.

## **EFFECTOS ADVERSOS**

Bilidren Enzimático suelen ser medicamentos bien tolerados por los pacientes. En raras ocasiones pueden producirse casos de diarrea o heces blandas. Si éstas o cualquier otra molestia no cesan o empeoran con el paso de los días, comuníquese con su médico.

## **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**

Informe a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, incluso medicamentos que no requieran receta médica.

## **DOSIS USUAL**

Su médico le indicará la dosis adecuada para su caso y el tiempo del tratamiento. En general, la dosis recomendada para adultos es de una tableta de Bilidren Enzimático tres veces al día, junto con las comidas. Dependiendo de la intensidad de las molestias, pueden administrarse hasta dos tabletas tres veces al día.

## **SOBREDOSIS**

En caso de una sobredosis con este medicamento acuda al centro de salud más cercano.

## **ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 30°C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**Vía de administración:** Oral

## **PRESENTACIONES**

Display x 6 cajas x 5 Tabletillas recubiertas, c/u.

Caja x 30 Tabletillas recubiertas.

**Venta Libre**

**Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este  
Prospecto: Junio del 2021



**Rocnarf**

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)