

# **Calcivit Forte**<sup>®</sup>

## *Calcio + Vitamina D3 + Zinc*

### *Suspensión*

#### **FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**

Estimado paciente,

Por favor lea cuidadosamente este Folleto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda o inquietud adicional, consulte siempre con su médico.

#### **COMPOSICIÓN:**

Cada 5 ml (una cucharadita) de la suspensión contienen:

- Carbonato de calcio: 750 mg  
(equivalentes a 300 mg de ión calcio)
- Vitamina D3 0,0025 mg  
(equivalentes a 100 UI de colecalciferol)
- Oxido de zinc: 9,335 mg  
(equivalentes a 7,5 mg de ión zinc)

Excipientes: sorbitol, glicerina, goma xanthan, celulosa microcristalina, sacarina sódica, metilparabeno, benzoato de sodio, sabor tutti frutti, color rojo FD&C 40, agua purificada.

#### **GRUPO TERAPÉUTICO**

Suplemento de vitaminas y minerales.

#### **INDICACIONES**

Suplemento nutricional de calcio, vitamina D y zinc para niños y jóvenes en crecimiento, mujeres embarazadas o dando de lactar, y personas con ingesta insuficiente o mayor requerimiento de calcio en su dieta diaria. Prevención y tratamiento de la osteoporosis en la mujer postmenopáusica.

#### **DOSIS USUAL**

Su médico le indicará la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso. En general, la dosis usual de CALCIVIT FORTE como suplemento de calcio es la siguiente:

Niños de 1 a 3 años: 5 ml de la suspensión una vez al día.

Niños mayores de 4 años, adolescentes y adultos: 10 ml de la suspensión o el

contenido de un sachet una vez al día.

Embarazo, lactancia, mujeres mayores de 51 años: 10 ml de la suspensión o el contenido de un sachet dos veces al día.

Para asegurar la adecuada absorción del calcio, CALCIVIT FORTE debe tomarse siempre junto con los alimentos, no con el estómago vacío.

#### **CONTRAINDICACIONES**

CALCIVIT FORTE no puede administrarse en personas que tengan alguna de las siguientes condiciones:

Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes del medicamento

Hipercalcemia (niveles elevados de calcio en la sangre)

Hipercalciuria (excreción elevada de calcio por la orina)

Cálculos renales de calcio

## PRECAUCIONES

Antes de iniciar su tratamiento con CALCIVIT FORTE informe a su médico acerca de cualquier alergia o problema de salud que usted tenga o haya tenido, especialmente hipercalcemia, cálculos renales o enfermedades del riñón, páncreas o corazón.

No tome este medicamento a dosis superiores a las recomendadas por su médico. La administración excesiva de suplementos de calcio por largos períodos de tiempo puede causar hipercalcemia (exceso de calcio en la sangre), principalmente en pacientes con antecedentes de enfermedades renales.

**Uso durante el embarazo y la lactancia:** Si usted está embarazada o dando de lactar, tome CALCIVIT FORTE de acuerdo a las instrucciones y bajo la supervisión de su médico.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuníquese a su médico acerca de cualquier otro medicamento que usted esté tomando. Los suplementos de calcio pueden interferir con la absorción de algunos tipos de medicamentos, incluyendo bifosfonatos (ej. alendronato) tetraciclinas (ej. doxiciclina, minociclina), antibióticos quinolónicos (ej. ciprofloxacina, levofloxacina) y levotiroxina. Mantenga una separación de al menos dos horas entre la toma de CALCIVIT FORTE y la de cualquier otro medicamento.

## EFFECTOS ADVERSOS

CALCIVIT FORTE suele ser un medicamento bien tolerado. En algunas ocasiones pueden darse molestias tales como estreñimiento, exceso de gases y malestar abdominal. Consulte con su médico si estas o cualquier otra molestia se mantienen o empeoran con el paso de los días.

## SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. La sobredosis con calcio puede manifestarse con síntomas tales

como náuseas o vómitos, pérdida del apetito, dolor de cabeza, debilidad y cansancio.

## ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

Vía de Administración: Oral

## PRESENTACIONES

CALCIVIT FORTE Suspensión,  
frasco por 120 ml y 240 ml  
CALCIVIT FORTE Sachets x 10 ml,  
caja por 20 sachets

Venta Libre.

## Elaborado por

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanka Marengo Km 5 ½  
Guayaquil – Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Julio del 2021.



[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)