

CARDIOVASC® 50

CARDIOVASC® 100

CARDIOVASC® H

CARDIOVASC® 100/12,5

CARDIOVASC® Forte

Tabletas

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

Precaución para el Uso en el Embarazo: Riesgo de Toxicidad Fetal

Si usted está embarazada o supone estarlo, suspenda de inmediato el tratamiento con estos medicamentos y consulte con su médico.

COMPOSICIÓN

CARDIOVASC®50: Cada tableta contiene 50 mg losartán.

CARDIOVASC® 100: Cada tableta contiene 100 mg de losartán.

CARDIOVASC® H: Cada tableta contiene 50 mg de losartán y 12,5 mg de hidroclorotiazida.

CARDIOVASC® 100/12,5: Cada tableta contiene 100 mg de losartán y 12,5 mg de hidroclorotiazida.

CARDIOVASC® Forte: Cada tableta contiene 100 mg de losartán y 25 mg de hidroclorotiazida.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antihipertensivo.

DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

El losartán es un agente antihipertensivo del grupo de los antagonistas de los receptores AT₁ de la angiotensina II, que actúa bloqueando la acción de la angiotensina II, una hormona con un potente efecto vasoconstrictor.

La hidroclorotiazida es un agente antihipertensivo que estimula la producción de una mayor cantidad de orina por parte de los riñones, lo que disminuye el volumen sanguíneo y por consiguiente la presión arterial.

La combinación del losartán con la hidroclorotiazida produce un efecto antihipertensivo más potente que el producido por el losartán o la hidroclorotiazida usados por separado, lo que es de gran utilidad en el tratamiento de la hipertensión arterial avanzada o que no responde al tratamiento con un solo medicamento.

INDICACIONES

CARDIOVASC®50 y **CARDIOVASC® 100** están indicados para el tratamiento de las siguientes condiciones:

- Hipertensión arterial, sólo o combinado con otros antihipertensivos.
- Hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos.
- Nefropatía en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

CARDIOVASC® H, **CARDIOVASC® 100/12.5** y **CARDIOVASC® Forte** están indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial avanzada o que no responde al tratamiento con un solo agente antihipertensivo.

CONTRAINDICACIONES

CARDIOVASC®50 y **CARDIOVASC® 100** no deben ser empleados por mujeres embarazadas ni por pacientes con antecedentes de alergia al losartán. No deben administrarse conjuntamente con aliskirén en pacientes diabéticos.

CARDIOVASC® H, **CARDIOVASC® 100/12.5** y **CARDIOVASC® Forte**, además de lo anterior, tampoco puede ser administrado a pacientes con anuria o con antecedentes de alergia a la hidroclorotiazida o a las sulfonamidas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe a su médico acerca de cualquier medicina que usted esté tomando, especialmente aliskirén, diuréticos ahorradores de potasio (p.ej., espironolactona), antihipertensivos inhibidores de la ECA (p.ej., enalapril), antiinflamatorios no esteroideos, suplementos de potasio o litio.

ADVERTENCIAS

Antes de iniciar el tratamiento comunique a su médico cualquier problema de salud que usted pueda tener, especialmente si tiene o ha tenido alguna de las siguientes condiciones: insuficiencia cardiaca, estenosis de las arterias renales, antecedentes de enfermedades del riñón o del hígado, hiperkalemia (elevación del potasio sérico) o alergias a medicamentos.

CARDIOVASC® H, CARDIOVASC® 100/12.5 y CARDIOVASC® Forte deben ser administrados con precaución a pacientes con diabetes mellitus, hiperuricemia o hiperlipidemia.

Si usted presenta erupciones en la piel o alguna otra reacción de tipo alérgico, suspenda el tratamiento y consulte con su médico.

Embarazo y lactancia: Si usted está embarazada o supone estarlo, suspenda inmediatamente el tratamiento con cualquiera de estos productos.

En el período de lactancia estos medicamentos deben ser administrados sólo bajo estricta supervisión médica.

EFFECTOS ADVERSOS

El losartán, sólo o combinado con la hidroclorotiazida, suele ser bastante bien tolerado por la mayoría de los pacientes. La mayoría de los efectos adversos suelen ser leves y no requieren la interrupción del tratamiento. Entre las molestias reportadas más frecuentemente se encuentran: cansancio, hipoglicemia, dolor de pecho, tos, diarreas, hipotensión, mareos o náuseas. Si estas o alguna otra molestia asociada con el uso de estos medicamentos persiste por varios días o empeora, consulte con su médico.

DOSIS

Salvo otra indicación de su médico, las dosis usualmente recomendadas son las siguientes:

CARDIOVASC®50 y CARDIOVASC® 100

- **Hipertensión arterial:** la dosis usual de inicio es de una tableta de **CARDIOVASC®50** de 50 mg una vez al día, que en caso necesario puede aumentar hasta un máximo de dos tabletas de **CARDIOVASC®50** de 50 mg o una tableta de **CARDIOVASC® 100** al día.
- **Hipertrofia ventricular izquierda:** la dosis usual de inicio es de una tableta de **CARDIOVASC®50** de 50 mg una vez al día, aumentándose luego a una tableta de **CARDIOVASC® H** o una tableta de **CARDIOVASC® 100** una vez al día.
- **Nefropatía en pacientes diabéticos tipo 2:** la dosis usual de inicio es de una tableta de **CARDIOVASC®50** de 50 mg una vez al día, pudiendo aumentarse luego a una tableta de **CARDIOVASC® 100** una vez al día.

CARDIOVASC® H, CARDIOVASC® 100/12.5 y CARDIOVASC® Forte

En pacientes que no responden al tratamiento con losartán solo, se recomienda comenzar la terapia con una tableta de **CARDIOVASC® H** una vez al día. Dependiendo de la respuesta del paciente, la dosis puede aumentarse a intervalos de tres semanas a una tableta de **CARDIOVASC® 100/12,5**, y luego, de ser necesario, a una tableta de

CARDIOVASC® Forte una vez al día.

No se recomienda administrar más de 100 mg de losartán y 25 mg de hidroclorotiazida al día. El máximo efecto antihipertensivo se logra a las tres semanas de iniciada la terapia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Las tabletas de **CARDIOVASC®50, CARDIOVASC® 100, CARDIOVASC® H, CARDIOVASC® 100/12,5, CARDIOVASC® Forte** pueden tomarse con o sin las comidas. Deben deglutirse sin masticar, con abundante líquido. Tome la dosis indicada por su médico todos los días, a la misma hora. Si olvidó tomar la dosis y no han pasado muchas horas, tómela apenas lo recuerde. Si ya se encuentra cerca de la hora de la siguiente dosis, espere hasta tomar la nueva dosis. No tome dosis dobles.

SOBREDOSIS

No se dispone de abundante información con respecto a la sobredosis con losartán. Los efectos más esperados de una sobredosis serían hipotensión y taquicardia. En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

PRESENTACIONES

CARDIOVASC® 50, caja x 28 tabs
CARDIOVASC® 100, caja x 28 tabs
CARDIOVASC® H, caja x 28 tabs
CARDIOVASC® 100/12,5, caja x 28 tabs
CARDIOVASC® Forte, caja x 28 tabs

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Junio del 2021

 **Rocnarf**
Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad
www.rocnarf.com