

# CEFALEXINA

*Cápsulas, polvo para suspensión*

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

## COMPOSICIÓN:

### **Cefalexina cápsulas de 500 mg**

Cada cápsula contiene cefalexina monohidrato compactada equivalente a 500 mg de cefalexina base.

### **Cefalexina suspensión de 250 mg/5 ml**

Cada 5 ml de la suspensión contienen cefalexina monohidrato equivalente a 250 mg de cefalexina base.

Excipientes: benzoato de sodio, lactosa monohidrato, citrato de sodio, carboximetilcelulosa, sacarina sódica, esencia de cereza polvo, color rojo FD&C 40, polisorbato 80.

## GRUPO TERAPÉUTICO

Antibiótico betalactámico

## DESCRIPCIÓN

La cefalexina es un antibiótico del grupo de las cefalosporinas, indicado para el tratamiento de ciertas infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la acción de este medicamento. La cefalexina interfiere con la formación de la pared celular de la bacteria, causando su ruptura y la muerte del microorganismo.

## INDICACIONES

Tratamiento de la faringitis aguda, otitis media, infecciones de la piel e infecciones genitourinarias causadas por bacterias sensibles a la cefalexina.

Su médico puede recetarle cefalexina para indicaciones no mencionadas en esta guía.

## CONTRAINDICACIONES

No use este medicamento si usted tiene antecedentes de reacciones alérgicas a la cefalexina o a otros antibióticos del grupo de las cefalosporinas.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento con cefalexina comunique a su médico si usted tiene alergia a

cualquier medicamento, especialmente del grupo de las penicilinas, o si tiene algún otro tipo de alergia. Informe a su médico acerca de cualquier problema de salud que usted tenga o haya tenido, especialmente enfermedades del hígado o de los riñones, colitis u otros problemas intestinales, o diabetes.

### ***Uso durante el embarazo y la lactancia:***

Informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar. El uso de la cefalexina durante el embarazo o la lactancia sólo debe darse por prescripción y bajo vigilancia médica.

## EFFECTOS ADVERSOS

En ciertas ocasiones pueden darse molestias tales como náuseas leves, vómitos, diarrea, mareos, cansancio, dolor de las articulaciones y secreción vaginal. Si estas o alguna otra molestia empeoran o no cesan con el paso de los días, comuníquelo a su médico. Si durante el tratamiento usted presenta diarrea acuosa o con sangre, póngase de inmediato en contacto con su médico.

Acuda de inmediato al centro de salud más cercano si usted presenta síntomas de una reacción alérgica, tales como ronchas en la piel, dificultad para respirar o hinchazón de la cara, la lengua, los labios o la garganta.

## **INTERACCIONES FARMACOLOGICAS**

Informe a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, especialmente warfarina, metformina y probenecid.

## **DOSIS USUAL**

Su médico le indicará la dosis adecuada para su caso y la duración del tratamiento. En general, la dosis recomendadas son:

- En niños menores de 12 años: 25 a 50 mg/kg/día, divididos en dos tomas diarias, cada 12 horas. En el tratamiento de la otitis media, la dosis es de 75 a 100 mg/kg/día, repartidos en cuatro tomas diarias, cada 6 horas.

- En adultos y jóvenes mayores de 15 años: una cápsula de 500 mg cada 12 horas.

La duración del tratamiento es por lo general de 7 a 14 días, dependiendo del tipo y gravedad de la infección. En el tratamiento de la faringoamigdalitis por estreptococos betahemolíticos, el tratamiento se debe extender por al menos 10 días.

## **SOBREDOSIS**

En caso de una sobredosis con este medicamento acuda al centro de salud más cercano. La ingesta de una sobredosis de cefalexina puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y presencia de sangre en la orina.

## **CONSEJOS DE USO**

Tome este medicamento tal como le indicó su médico, a las mismas horas todos los días y durante todo el tiempo indicado de tratamiento, aun si usted ya se siente libre de síntomas. Tome el medicamento con un vaso lleno de agua, con o sin las comidas.

Si usted se olvida de tomar una dosis, tómela tan pronto se acuerde. Si es casi la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada ni tome una cantidad mayor de lo indicado.

Para preparar la suspensión de cefalexina, golpee ligeramente el frasco, agregue luego agua fría previamente hervida hasta la marca indicada en el envase y agite hasta obtener una suspensión homogénea. La suspensión reconstituida puede conservarse por 7 días a temperatura ambiente o 10 días en refrigeración.

Agite la suspensión antes de cada dosis.

## **ALMACENAMIENTO**

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y a una temperatura no mayor a 30°C.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

## **Vía de administración oral**

## **PRESENTACIONES**

Cefalexina 500 mg cápsulas, caja por 30

Cefalexina 250 mg/5 ml polvo para suspensión, frasco por 60 ml y 100 ml

**Venta bajo Receta Médica.**

## **Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Julio del 2021



[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)