

# CIPROFLOXACINO

## *Comprimidos Recubiertos de 500 mg*

### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

### COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene clorhidrato de ciprofloxacina equivalente a 500 mg de ciprofloxacina base. Excipientes: almidón de maíz, polivinilpirrolidona, estearato de magnesio, almidón pregelatinizado, alcohol etílico\*. Cubierta: Opadry blanco, sucralosa, alcohol etílico\*.

\*Desaparecen durante el proceso de manufactura.

### GRUPO TERAPÉUTICO

Antibacteriano fluoroquinolónico.

### DESCRIPCIÓN

La ciprofloxacina es un antibiótico perteneciente al grupo de las fluoroquinolonas, indicado para el tratamiento de varios tipos de infecciones causadas por bacterias susceptibles al medicamento.

### INDICACIONES, DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Su médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso. En general, las indicaciones recomendadas y las dosis usuales son las siguientes:

- Infecciones no complicadas de las vías urinarias: 500 mg cada 12 horas por 3 días.
- Infecciones moderadas o graves de las vías urinarias: 500 mg cada 12 horas por 7 a 14 días.
- Prostatitis bacteriana crónica: 500 mg cada 12 horas por 28 días.
- Infecciones de las vías respiratorias bajas: 500 mg cada 12 horas por 7 a 14 días.
- Sinusitis aguda: 500 mg cada 12 horas por 10 días.
- Infecciones de la piel y tejidos blandos: 500 mg cada 12 horas por 7 a 14 días.
- Gastroenteritis bacteriana aguda: 500 mg cada 12 horas por 5 a 7 días.
- Fiebre tifoidea: 500 mg cada 12 horas por 10 días.
- Uretritis y cervicitis gonocócica no complicada: 500 mg en dosis única.

En los pacientes con disminución de la función renal, la dosis se modifica de acuerdo a las instrucciones del médico.

### CONTRAINDICACIONES

No use este producto si usted tiene antecedentes de alergia a la ciprofloxacina o a cualquier otro antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas, si usted está en tratamiento con tizanidina o si usted tiene antecedentes de miastenia grave.

### ADVERTENCIAS

En raros casos, los antibióticos fluoroquinolónicos pueden causar daños en los tendones (tales como tendinitis y ruptura de los tendones), principalmente en pacientes de más de 60 años, pacientes que están tomando corticoesteroides, o pacientes que han recibido trasplantes de órganos. Si usted presenta dolor o hinchazón en los tendones, músculos o articulaciones, suspenda el tratamiento y consulte inmediatamente con su médico.

### PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento con CIPROFLOXACINO informe a su médico acerca de cualquier alergia o problema de salud que usted tenga o haya tenido, especialmente alteraciones del ritmo cardíaco, antecedentes de golpes en la cabeza o tumores cerebrales, problemas articulares, enfermedades del hígado o del riñón, epilepsia o convulsiones, diabetes, debilidad muscular o problemas para respirar, hipokalemia, e historia personal o familiar de síndrome de QT largo.

**Uso en el embarazo y la lactancia:** La ciprofloxacina no está indicada durante el embarazo o la lactancia. Antes de iniciar el tratamiento con este producto informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar.

**Uso en Pediatría:** La ciprofloxacina no está indicado para menores de 18 años de edad.

**Precauciones especiales:** La ciprofloxacina puede en ocasiones producir somnolencia o mareos. No conduzca ni realice actividades que requieren de un gran nivel de alerta hasta que esté seguro de que usted puede llevar a cabo estas actividades con seguridad.

## EFFECTOS ADVERSOS

En algunos casos durante el tratamiento con este medicamento pueden darse reacciones tales como náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, visión borrosa, nerviosismo, ansiedad, agitación o insomnio. Si cualquiera de estos efectos persiste por más de unos pocos días o empeora, consulte con su médico.

Si durante el tratamiento usted experimenta mareos fuertes, palpitaciones, dolores o hinchazón de las articulaciones, diarrea acuosa o con sangre, confusión, convulsiones, dolor intenso de cabeza, erupciones en la piel o cualquier otra reacción inusual, interrumpa el tratamiento y consulte de inmediato con su médico.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No tome las comprimido de CIPROFLOXACINO conjuntamente con antiácidos, sucralfate, suplementos de hierro o multivitamínicos que contengan calcio, hierro o zinc, porque estos productos pueden interferir con la adecuada absorción del medicamento. Estos agentes deben tomarse por lo menos seis horas antes o dos horas después de la administración de CIPROFLOXACINO.

Informe a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, especialmente anticoagulantes orales, clozapina, ciclosporina, metrotexate, fenitoína y antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno o naproxeno.

## CONSEJOS DE USO

Tome las comprimido de CIPROFLOXACINO

con un vaso lleno de agua, con o sin los alimentos, todos los días a las mismas horas, y por todo el tiempo de tratamiento, de acuerdo a lo indicado por su médico. Ingiera bastantes líquidos durante el tratamiento. No tome este medicamento conjuntamente con productos lácteos como leche o yogurt, o con jugos fortificados con calcio, ya que pueden interferir con la efectividad del medicamento.

La ciprofloxacina puede incrementar su sensibilidad a los rayos del sol. Evite exponerse al sol por mucho tiempo.

## SOBREDOSIS

En caso de sobredosis acuda de forma urgente al centro de salud más cercano. Los síntomas de una sobredosis pueden incluir convulsiones, problemas urinarios, debilidad, presencia de labios azulados y piel pálida.

## ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

## Vía de administración oral

## PRESENTACIÓN

CIPROFLOXACINO 500 mg comprimidos recubiertos, caja x 12

## Venta Bajo Receta Médica

## Elaborado por

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanka Marengo Km 5½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Julio del 2021



# Rocnarf

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)

Rev. 01