

CLOPIDOGREL

Tabletas de 75 mg

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea cuidadosamente este inserto ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene clopidogrel sulfato equivalente a 75 mg de clopidogrel.

Excipientes: Lactosa ahidra, Celulosa microcristalina PH 200, Croscamelosa Sódica, Estearato de Magnesio, Talco, Dioxido de silicio coloidal, Solución cubierta: opadry blanco, * alcohol etílico, * desaparece durante el proceso de manufactura.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antiagregante plaquetario.

DESCRIPCIÓN

El clopidogrel es un inhibidor de la agregación y activación plaquetaria que se utiliza para evitar que las plaquetas se adhieran unas a otras y formen coágulos que puedan ocluir las arterias en pacientes que han tenido un infarto cardiaco o cerebral reciente, y en pacientes con ciertas enfermedades del corazón o los vasos sanguíneos.

INDICACIONES, DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Su médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso. En general, las indicaciones recomendadas y las dosis usuales son las siguientes:

- **Síndrome coronario agudo:**

En angina inestable y en infarto de miocardio sin elevación del segmento S-T, se recomienda una dosis inicial de 300 mg, seguidos de 75 mg una vez al día, en combinación con 75 a 325 mg de aspirina una vez al día.

En infarto de miocardio con elevación del segmento S-T, la dosis recomendada es de 75 mg una vez al día en combinación con 75 a 325 mg de aspirina una vez al día.

- **Infarto de miocardio o ACV reciente, enfermedad vascular periférica:**

La dosis recomendada es de 75 mg una vez al día, con o sin los alimentos.

CONTRA INDICACIONES

No use este producto si usted tiene antecedentes de alergia al clopidogrel.

El clopidogrel está contraindicado en pacientes con sangrado patológico agudo, incluyendo úlcera péptica y hemorragia intracraneal.

PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento con CLOPIDOGREL informe a su médico acerca de cualquier alergia o problema de salud que usted tenga o haya tenido, especialmente úlceras gástricas o duodenales y problemas de sangrado, o si usted va a ser sometido a una intervención quirúrgica a un procedimiento dental.

Uso en el embarazo y la lactancia: Informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar. No se dispone de datos acerca de la seguridad del clopidogrel durante el embarazo o la lactancia.

EFECTOS ADVERSOS

En ocasiones el tratamiento con CLOPIDOGREL puede producir picazón en la piel.

Informe a su médico inmediatamente si durante el tratamiento usted presenta sangrados inesperados o que duran mucho tiempo, sangre en la orina, heces rojas o negras, hematomas que aparecen sin explicación o que se agrandan, tos o vómitos con sangre, dolor en el pecho, debilidad o dolor de cabeza súbito, palidez o cualquier otra reacción inusual.

No suspenda el tratamiento sin informar primero a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No use omeprazol o esomeprazol si usted está en tratamiento con CLOPIDOGREL.

El uso de CLOPIDOGREL en conjunto con ciertos medicamentos aumenta el riesgo de sangrado. Informe a su médico acerca de cualquier medicamento que usted este tomando, especialmente aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes orales como la warfarina y antidepresivos. Evite la ingesta de alcohol durante el tratamiento con CLOPIDOGREL ya que puede aumentar el riesgo de sangrado digestivo.

CONSEJOS DE USO

Tome las tabletas de CLOPIDOGREL con o sin los alimentos, y por todo el tiempo de tratamiento, de acuerdo a lo indicado por su médico. Si usted va a ser sometido a una cirugía, informe a su médico. Su médico le puede indicar que interrumpa esta medicina por lo menos 5 días antes de la cirugía para evitar sangrados excesivos.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis acuda de forma urgente al centro de salud más cercano. La sobredosis con CLOPIDOGREL puede ocasionar vómitos, debilidad, dificultad para respirar y hemorragias digestivas.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y la humedad. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

PRESENTACIÓN

CLOPIDOGREL 75 mg tabletas, caja por 12

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:

Septiembre del 2018



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com