

# COTRIMOXAZOL

Tabletas 160 mg/800 mg

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente,

Por favor lea cuidadosamente este Folleto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda o inquietud adicional, consulte siempre con su médico.

## COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Trimetoprima ..... 160 mg

Sulfametoxazol ..... 800 mg

Excipientes: polivinilpirrolidona, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, almidón pregelatinizado.

## GRUPO TERAPÉUTICO

Antibacteriano de amplio espectro.

## DESCRIPCIÓN

COTRIMOXAZOL es un antibacteriano sintético formado por la combinación de dos fármacos, la trimetoprima y el sulfametoxazol, indicado para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias susceptibles en pacientes adultos.

## INDICACIONES

Su médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso. En general, las indicaciones y dosis recomendadas de COTRIMOXAZOL en adultos son las siguientes:

- Infecciones de las vías urinarias, shigelosis:  
1 tableta cada 12 horas por 10 a 14 días.
- Exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica: 1 tableta cada 12 horas por 14 días.
- Diarrea del viajero: 1 tableta cada 12 horas por 5 días.

## CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia al cotrimoxazol, a la trimetoprima o a cualquier medicamento del grupo de las sulfonamidas, antecedentes de trombocitopenia inmune causada por la trimetoprima o las sulfonamidas, anemia megaloblástica por deficiencia de folato, insuficiencia hepática o renal graves, menores de 2 meses de edad.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuníquese a su médico sobre cualquier otro medicamento que usted esté tomando. Entre los medicamentos que pueden interactuar con el cotrimoxazol se encuentran los anticoagulantes orales, la ciclosporina, la fenitoína, algunas vacunas, la metenamina y el metroxate.

## ADVERTENCIAS

Antes de iniciar el tratamiento con COTRIMOXAZOL informe a su médico si usted ha tenido reacciones alérgicas a la trimetoprima o a cualquier medicamento derivado de las sulfas, o si usted sufre de algún otro tipo de alergia.

Comuníquese a su médico cualquier otro problema de salud que usted tenga, especialmente enfermedades del riñón, del hígado, de la sangre, asma e hipotiroidismo. Si usted sufre de diabetes, controle su nivel de glicemia en la sangre de forma regular, de acuerdo con las instrucciones de su médico. En ocasiones puede requerirse un ajuste de su medicación antidiabética durante el tratamiento con COTRIMOXAZOL.

### **Uso en el embarazo, lactancia y pediatría:**

COTRIMOXAZOL no está indicado para mujeres embarazadas o dando de lactar. El uso de cotrimoxazol durante el embarazo puede estar asociado a un riesgo mayor de malformaciones congénitas.

## EFECTOS ADVERSOS

En la mayoría de los casos este medicamento es bien tolerado por los pacientes. En ciertos casos pueden presentarse efectos secundarios tales como diarreas, náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Si alguna de estas molestias se mantiene o empeora con el paso de los días, comuníquelo a su médico. En caso de desarrollar molestias más graves, tales como debilidad muscular, cambios del estado de ánimo, presencia de sangre en la orina o disminución de la cantidad de orina, mareo excesivo, sudoración o temblores, póngase en contacto con su médico.

## SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. Los síntomas de una sobredosis grave con cotrimoxazol incluyen náuseas, vómitos o diarreas intensas, mareo o somnolencias muy marcadas y cambios del estado de ánimo.

## CONSEJOS DE USO

Tome la tableta con un vaso lleno de agua, todos los días a la misma hora, de acuerdo a las instrucciones de su médico, e ingiera bastantes líquidos durante el tratamiento. Si se presentan molestias digestivas, tome la dosis junto con algún alimento o con leche. Continúe tomando esta medicina durante todo el tiempo que su médico le ha prescrito. Evite exponerse al sol por tiempo prolongado durante el tiempo que dure el tratamiento.

## ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

## PRESENTACIONES

COTRIMOXAZOL TABLETAS, caja por 12, 24, 30, 60, 100 y 152 Tabletas

### **Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. de las Américas N° 100 y Calle 7ª  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Octubre del 2016.

 **Rocnarf**  
Laboratorios Farmacéuticos  
que Cuidan su Salud  
[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)