

DESINFLAM RETARD®

*Diclofenaco sódico en
microgránulos de liberación retardada
Cápsulas de 100 mg*

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

Diclofenaco sódico en microgránulos de liberación retardada.....420 mg
(equivalentes a 100 mg de diclofenaco)

GRUPO TERAPÉUTICO

Antiinflamatorio no Esteroidal

DESCRIPCIÓN

DESINFLAM RETARD® contiene como principio activo al diclofenaco sódico, un antiinflamatorio no esterooidal (AINE) que actúa reduciendo la formación de sustancias que causan dolor e inflamación en el cuerpo.

INDICACIONES

DESINFLAM RETARD® está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas de la artritis reumatoidea, la osteoartritis, y la espondilitis anquilosante.

Su médico puede haberle también prescrito DESINFLAM RETARD® para el alivio del dolor y la inflamación en condiciones tales como migraña, dolores menstruales, dolores postraumáticos y postquirúrgicos, sinovitis, bursitis y tendinitis.

CONTRAINDICACIONES

No use este producto si usted tiene alguna de las siguientes condiciones: alergia al diclofenaco sódico; episodios de asma, urticaria u otras reacciones alérgicas luego de tomar aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos; úlcera péptica, hemorragia digestiva o perforación gástrica; insuficiencia renal o hepática grave.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El uso de antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo el diclofenaco sódico, puede elevar el

riesgo de determinados efectos adversos cardiovasculares, especialmente en pacientes con determinados factores de riesgo, y en tratamientos largos. Su uso se asocia también a un incremento del riesgo de efectos adversos sobre el sistema digestivo, incluyendo sangrado, úlcera y perforación, especialmente en pacientes ancianos. Por tal motivo, como sucede con cualquier otro antiinflamatorio no esterooidal, DESINFLAM RETARD® debe utilizarse siempre a la dosis efectiva más baja posible y durante el período de tiempo más corto posible.

DESINFLAM RETARD® debe ser usado con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, antecedentes de úlcera o hemorragia digestiva, deshidratación, insuficiencia renal o hepática, pacientes en tratamiento con diuréticos o inhibidores de la ECA y pacientes mayores de 65 años.

Uso en el embarazo y la lactancia: DESINFLAM RETARD® no debe ser utilizado durante el tercer trimestre del embarazo.

El diclofenaco sódico aparece en la leche materna, por lo que el médico puede recomendar suspender la lactancia materna mientras dure el tratamiento con DESINFLAM RETARD®.

Uso en niños: DESINFLAM RETARD® no está indicado para el uso en menores de 18 años de edad.

EFFECTOS ADVERSOS

En ocasiones, el tratamiento con DESINFLAM RETARD® puede dar lugar a molestias tales como dolor abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento, dolores de cabeza, somnolencia y mareos. Si cualquier de estos efectos persiste por más de unos pocos días o empeora, consulte con su médico lo más pronto posible. Informe a su médico de forma inmediata ante cualquier efecto raro o inusual durante el tratamiento con este producto.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Antes de iniciar el tratamiento con DESINFLAM RETARD® informe a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, especialmente aspirina u otros AINE, medicamentos antidepresivos, antihipertensivos, diuréticos, antimicóticos, anticoagulantes plaquetarios, metrotexate o antibióticos fluoroquinolónicos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La duración del tratamiento depende del tipo y la intensidad del cuadro clínico.

En la mayoría de las ocasiones, la dosis usualmente recomendada de DESINFLAM RETARD® es de una cápsula de 100 mg una vez al día.

En el contexto del tratamiento del dolor agudo no es recomendable la administración continua de DESINFLAM RETARD® por más de 5 a 7 días consecutivos.

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Las cápsulas de DESINFLAM RETARD® deben deglutirse enteras, con un vaso lleno de agua y sin masticar. Para evitar la aparición de molestias abdominales es recomendable tomar las cápsulas junto con alimentos y no acostarse durante los 10 minutos posteriores a la toma.

Evite el consumo excesivo de alcohol durante el tratamiento con DESINFLAM RETARD®.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, se debe acudir de forma urgente al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis con diclofenaco sódico se incluyen el dolor abdominal intenso, vómito color café oscuro, somnolencia marcada y convulsiones.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRESENTACIÓN

DESINFLAM RETARD® 100 mg, caja por 12 cápsulas de liberación retardada.

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo, km 5.5
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Junio del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com