

DIME®

Policresuleno

Supositorios vaginales

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada supositorio vaginal contiene 90 mg de policresuleno.

Excipientes: polietilenglicol 1450, 3350.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antiséptico ginecológico.

DESCRIPCIÓN

DIME® contiene como principio activo policresuleno, un agente astringente que estimula la descamación y eliminación del epitelio cervical y vaginal lesionado y promueve una rápida reepitelización, ayudando también a mantener un pH vaginal adecuado y promoviendo la recuperación de la flora bacteriana normal de la vagina.

INDICACIONES

DIME® está indicado como tratamiento de apoyo para el alivio de la secreción, el prurito, el ardor y otras molestias causadas por la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis vaginal y la candidiasis vaginal, y en las lesiones erosivas del cérvix y la vagina. Su médico puede recetarle DIME® para indicaciones no incluidas en esta guía.

CONTRAINDICACIONES

No use este medicamento si usted ha tenido reacciones alérgicas a cualquiera de los componentes de la fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se dispone de información sobre interacciones del policresuleno con otros medicamentos.

ADVERTENCIAS

Antes de iniciar el tratamiento con DIME® informe a su médico acerca de cualquier alergia u otro problema de salud que usted tenga. Es posible que durante el tratamiento usted experimente una mayor cantidad de secreciones vaginales. Esto se debe a la eliminación del tejido vaginal necrosado y no debe ser motivo de preocupación, ya que forma parte de la acción terapéutica del medicamento.

Uso en el embarazo y la lactancia: DIME® debe usarse durante el embarazo o la lactancia sólo por prescripción y bajo vigilancia médica.

EFFECTOS ADVERSOS

En ciertos casos puede ocurrir irritación o resequedad vaginal durante el tratamiento. Ante estas o cualquier molestia que no cese o empeore con el paso de los días consulte a su médico.

DOSIS

En general, y salvo otra indicación por parte de su médico, la dosis recomendada es de un supositorio aplicado por vía intravaginal profunda por 10 noches consecutivas, al acostarse.

SOBREDOSIS

No se dispone de información acerca de sobredosis con policresuleno.

CONSEJOS DE USO

Se recomienda no mantener relaciones sexuales y no aplicarse las duchas vaginales durante el tratamiento. Este medicamento es de uso exclusivamente por vía vaginal. No ingerir.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VAGINAL

PRESENTACIONES

DIME® Supositorios Vaginales de 90 mg,
caja por 6

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Junio del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com