

# **DOLOCOX<sup>®</sup> 200**

## *Celecoxib*

### *Cápsulas*

#### **FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**

Estimado paciente,

Por favor lea cuidadosamente este Folleto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda o inquietud adicional, consulte siempre con su médico.

#### **COMPOSICIÓN**

**DOLOCOX<sup>®</sup> 200:** Cada cápsula contiene 200 mg de celecoxib.

Excipientes: Croscarmelosa sódica, Lactosa monohidrato, Polivinilpirrolidona, estearato de Magnesio, Lauril Sulfato de Sodio, Alcohol Etilico

#### **GRUPO TERAPÉUTICO**

Antiinflamatorio y analgésico

#### **DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN**

El celecoxib es un agente antiinflamatorio y analgésico del grupo de los inhibidores específicos de la ciclooxigenasa-2, que bloquea específicamente la síntesis de las prostaglandinas causantes del dolor y la inflamación. A diferencia de los antiinflamatorios tradicionales, el celecoxib no interfiere de modo significativo con la acción de la enzima ciclooxigenasa-1, por lo que su administración se acompaña de un riesgo mucho más bajo de molestias abdominales y úlceras gástricas.

#### **INDICACIONES**

**DOLOCOX<sup>®</sup>** está indicado para el tratamiento del dolor agudo y para el alivio del dolor y la inflamación en pacientes con artritis reumatoide, osteoartritis y dismenorrea primaria.

#### **CONTRAINDICACIONES**

**DOLOCOX<sup>®</sup>** no puede ser usado por personas con hipersensibilidad al celecoxib o a las sulfonamidas, o por quienes tengan antecedentes de asma, urticaria o reacciones alérgicas producidas por la ingesta de aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos, o insuficiencia renal avanzada.

**DOLOCOX<sup>®</sup>** no debe administrarse durante el último trimestre de embarazo.

#### **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

Informe a su médico acerca de cualquier medicina que usted esté tomando, especial-

mente warfarina, litio, aspirina, antihipertensivos, furosemida, y cualquier antiinflamatorio no esteroideo.

#### **ADVERTENCIAS**

Antes de iniciar el tratamiento con **DOLOCOX<sup>®</sup>** comunique a su médico cualquier problema de salud, especialmente si usted tiene más de 65 años y ha tenido úlcera péptica o hemorragia digestiva, o cualquier condición que aumente el riesgo de sangrado.

No se recomienda administrar **DOLOCOX<sup>®</sup>** a pacientes mayores de 65 años con antecedentes de patologías cardiovasculares o con al menos un factor de riesgo cardiovascular. El uso crónico de celecoxib, como sucede con todos los antiinflamatorios de su clase, puede aumentar el riesgo de complicaciones vasculares en el paciente, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, especialmente en pacientes con riesgos preexistentes.

**Embarazo y lactancia:** Durante la primera parte del embarazo, **DOLOCOX<sup>®</sup>** sólo debe utilizarse en casos muy específicos y bajo supervisión médica. Este producto no debe ser administrado en el tercer trimestre del embarazo porque podría ocasionar el cierre prematuro del conducto arterioso.

El celecoxib se excreta por la leche materna, y uso durante la lactancia debe limitarse a casos individuales y bajo vigilancia médica.

## EFFECTOS ADVERSOS

El celecoxib suele ser bastante bien tolerado por la mayoría de los pacientes. La mayoría de los efectos adversos suelen ser leves y no requieren la interrupción del tratamiento. Entre las molestias reportadas más frecuentemente se encuentran dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea, indigestión y flatulencia. Si estas o alguna otra molestia asociada con el uso de estos medicamentos persiste por varios días o empeora, consulte con su médico.

Si usted experimenta la aparición de ronchas en la piel u otros síntomas alérgicos durante el tratamiento con **DOLOCOX®**, interrumpa la terapia y consulte con su médico.

## DOSIS

En pacientes adultos, las dosis usualmente recomendadas de celecoxib son las siguientes:

- Tratamiento del dolor agudo y la dismenorrea primaria: 400 mg como dosis inicial, luego 200 mg cada 12 horas según la necesidad.
- Osteoartritis: 200 mg al día, en una sola dosis o en dos tomas de 100 mg cada 12 horas.
- Artritis reumatoide: 100 a 200 mg una o dos veces al día.

## CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Las cápsulas de **DOLOCOX®** puede tomarse con o sin las comidas. Para disminuir la posibilidad de molestias abdominales, sobre todo en casos de dosis altas, se recomienda tomarlas con las comidas o un vaso de leche. Tome la dosis indicada por su médico todos los días, a la misma hora. Si olvidó tomar la dosis y no han pasado muchas horas, tómela apenas lo recuerde. Si ya se encuentra cerca de la hora de la siguiente dosis, espere hasta tomar la nueva dosis. No tome dosis dobles.

## SOBREDOSIS

No se dispone de abundante información con respecto a la sobredosis con celecoxib. En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

## ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

## PRESENTACIONES

**DOLOCOX® 200**, Caja x 12 Cápsulas.

Venta Bajo Receta Médica

## Elaborado por

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km. 5½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Agosto del 2021



# Rocnarf

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)