

DOLONEX[®]

Naproxeno sódico
Tabletas de 550 mg

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene:

Naproxeno sódico.....550 mg

GRUPO TERAPÉUTICO

Antiinflamatorio no Esteroidal

DESCRIPCIÓN

DOLONEX[®] contiene como principio activo al naproxeno sódico, un antiinflamatorio no esterooidal (AINE) que actúa reduciendo la formación de sustancias que causan dolor e inflamación en el cuerpo.

INDICACIONES

DOLONEX[®] está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas de la artritis reumatoidea, la osteoartritis, y la espondilitis anquilosante, y para el alivio sintomático de la inflamación y el dolor en condiciones tales como dolores menstruales, gota, dolores dentales, cefaleas, dolores postraumáticos y postquirúrgicos, bursitis y tendinitis.

CONTRAINDICACIONES

No use este producto si usted tiene alguna de las siguientes condiciones: alergia al naproxeno sódico; episodios de asma, urticaria u otras reacciones alérgicas luego de tomar aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos; úlcera péptica, hemorragia digestiva o perforación gástrica; insuficiencia renal o hepática grave.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento con este producto comunique a su médico acerca de cualquier alergia o condición médica que usted tenga o haya tenido, especialmente enfermedades del corazón, hipertensión, antecedentes de úlcera o hemorragia digestiva, enfermedades renales o enfermedades hepáticas.

El uso de antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo el naproxeno sódico, puede raramente aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas o con el uso a largo plazo. En muy raros casos, el naproxeno sódico puede también causar sangrado digestivo, sobre todo en pacientes mayores. Al igual que sucede con cualquier otro antiinflamatorio no esterooidal, utilice DOLONEX[®] a la dosis más baja posible y siempre de acuerdo a las instrucciones de su médico.

Uso en el embarazo y la lactancia: DOLONEX[®] no debe ser utilizado durante el tercer trimestre del embarazo.

El naproxeno sódico aparece en la leche materna. Si usted está dando de lactar, consulte con su médico antes de usar DOLONEX[®].

Uso en niños: DOLONEX[®] no está indicado para el uso en menores de 18 años de edad.

EFFECTOS ADVERSOS

En ocasiones, el tratamiento con DOLONEX® puede dar lugar a molestias tales como dolor abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento, dolores de cabeza, somnolencia y mareos. Si cualquiera de estos efectos persiste por más de unos pocos días o empeora, consulte con su médico lo más pronto posible.

Informe a su médico de forma inmediata si usted experimenta cualquiera de los siguientes síntomas durante el tratamiento con DOLONEX®: dificultad para respirar, dolor de pecho, debilidad en alguna parte de su cuerpo, dificultad para hablar, hinchazón de la cara.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Antes de iniciar el tratamiento con DOLONEX® informe a su médico si usted está tomando otros medicamentos, especialmente aspirina u otros AINE, inhibidores de la ECA (enalapril, otros), litio, metrotexate y warfarina.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La duración del tratamiento depende del tipo y la intensidad del cuadro clínico.

En la mayoría de las ocasiones, la dosis usualmente recomendada de DOLONEX® es de una tableta de 550 mg cada 12 horas.

En el contexto del tratamiento del dolor agudo no es recomendable la administración continua de DOLONEX® por más de 5 a 7 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VÍA ORAL

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Las tabletas de DOLONEX® deben deglutirse con un vaso lleno de agua y sin masticar. Para evitar la aparición de molestias abdominales es recomendable tomar las tabletas junto con alimentos y no acostarse durante los 10 minutos posteriores a la toma.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, se debe acudir de forma urgente al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis con naproxeno sódico se incluyen el dolor abdominal intenso, vómito color café oscuro, somnolencia marcada y convulsiones.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

DOLONEX® 550 mg, caja por 30 tabletas

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión del Prospecto:
Febrero 2021



www.rocnarf.com