

# ENALAPRIL

Tabletas de 10 mg

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

## COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene 10 mg de maleato de enalapril.

Excipientes: lactosa, almidón de maíz, goma xanthan, color verde menta FD&C 7, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio.

## GRUPO TERAPÉUTICO

Antihipertensivo inhibidor de la ECA.

## DESCRIPCIÓN

El enalapril es un medicamento antihipertensivo que actúa inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, bloqueando la conversión de angiotensina I en angiotensina II. El tratamiento con enalapril normaliza los valores de presión arterial y previene las complicaciones de la hipertensión arterial en el largo plazo.

## INDICACIONES

Tratamiento de la hipertensión arterial, sólo o en combinación con otros medicamentos; insuficiencia cardiaca congestiva sintomática; disfunción ventricular izquierda asintomática.

## CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia al enalapril, historial de angioedema provocado por otros inhibidores de la ECA (por ejemplo captopril o lisinopril), angioedema hereditario o idiopático, tratamiento concomitante con aliskirén en pacientes con diabetes, embarazo.

## PRECAUCIONES

**No use este medicamento durante el embarazo. Si usted sale embarazada durante el tratamiento con enalapril, suspenda inmediatamente el tratamiento y consulte a su médico.**

Antes de iniciar el tratamiento informe a su médico acerca de cualquier alergia o problema de salud que usted tenga o haya tenido,

especialmente angioedema, enfermedades de los riñones o del hígado, diabetes, problemas de coagulación, niveles elevados de potasio en sangre, y enfermedades del corazón o insuficiencia cardiaca.

El enalapril no está indicado para mujeres que están dando de lactar.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Antes de comenzar su tratamiento con enalapril informe a su médico acerca de cualquier otro medicamento que usted esté tomando, especialmente litio, diuréticos y antiinflamatorios no esteroides tales como ibuprofeno o naproxeno.

## EFECTOS ADVERSOS

En ocasiones el tratamiento con enalapril puede acompañarse de molestias menores tales como mareos, cansancio, tos seca, alteraciones del gusto, dolor de cabeza, boca seca, náuseas, malestar abdominal y picazón de la piel. Informe a su médico si éstas o cualquier otra molestia no desaparecen o empeoran con el paso de los días.

Si durante el tratamiento usted llegase a presentar signos de una reacción alérgica tales como ronchas en la piel, dolor de cabeza intenso, dificultad para respirar e hinchazón de la cara o los labios, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Consulte a su médico si durante el tratamiento usted experimenta síntomas de alguna infección, tales como dolor de garganta o fiebre.

## **DOSIS USUAL**

Para el tratamiento de la hipertensión arterial, la dosis recomendada de inicio es de 5 mg una vez al día. De acuerdo a la necesidad del paciente, la dosis de mantenimiento oscila entre 10 y 40 mg diarios, en una o dos tomas diarias.

## **SOBREDOSIS**

En caso de una sobredosis masiva con este medicamento acuda al centro de salud más cercano.

## **ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**Vía de Administración: Oral**

## **PRESENTACIÓN**

Enalapril 10 mg Tabletas, caja x 30.

Venta Bajo Receta Médica

## **Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:

Mayo del 2021



# **Rocnarf**

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

**[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)**