

Ferromalt®

Hierro polimaltosado
Jarabe, gotas, viales

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Ferromalt Jarabe

Cada 5 ml del jarabe contienen 50 mg de hierro III (como complejo de hidróxido de hierro polimaltosa).

Excipientes: Propilparabeno, metilparabeno, edetato de sodio, glicerina, sorbitol, ácido cítrico, citrato de sodio, aspartamo, sacarosa, esencia de fresa, esencia de vainilla, agua purificada.

Ferromalt Gotas

Cada ml del gotero contienen 50 mg de hierro III (como complejo de hidróxido de hierro polimaltosa).

Excipientes: propilparabeno, metilparabeno, edetato de sodio, glicerina, sorbitol, ácido cítrico, citrato de sodio, agua purificada.

Ferromalt Viales

Cada 5 ml del vial contienen 100 mg de hierro III (como complejo de hidróxido de hierro polimaltosa).

Excipientes: propilparabeno, metilparabeno, sorbitol, glicerina, sabor vainilla, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Suplemento de hierro.

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

FERROMALT contiene como principio activo al complejo de hidróxido férricopolimaltosado, una forma de suplemento de hierro que en comparación con las sales de hierro tradicionales suele ser mejor tolerado, producir menos molestias abdominales y presentar menos interacciones con los alimentos y otros medicamentos.

FERROMALT está indicado para la prevención y el tratamiento de la anemia por falta de hierro en niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos en general.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula; hemocromatosis, hemosiderosis. FERROMALT jarabe contiene aspartamo. No debe administrarse a pacientes con fenilcetonuria.

PRECAUCIONES

Informe a su médico acerca de cualquier alergia o condición médica que usted tenga o haya tenido. Antes de iniciar su tratamiento con FERROMALT el médico debe descartar la presencia de anemia hemolítica y otros tipos de anemia no causada por falta de hierro. Para evitar la sobrecarga de hierro es recomendable la realización de controles periódicos de los niveles sanguíneos de hierro durante el tratamiento.

Uso durante el embarazo y la lactancia: Si usted está embarazada o dando de lactar, el tratamiento con FERROMALT debe hacerse por indicación y bajo vigilancia médica.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe a su médico acerca de cualquier medicamento, suplemento vitamínico o producto natural que usted esté tomando. Su médico puede indicarle que tome ciertos medicamentos a horas diferentes de la dosis de FERROMALT. Si usted toma antiácidos, debe haber una separación de al menos dos horas entre la dosis de FERROMALT y la toma del antiácido.

EFFECTOS ADVERSOS

El hierro polimaltosado es por lo general bien tolerado. En algunas ocasiones pueden presentarse molestias tales como malestar abdominal, náuseas, estreñimiento o diarrea y coloración oscura de las heces. Consulte con su médico si estas o cualquier otra molestia no desaparecen o empeoran con el paso de los días.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Su médico le indicará la dosis y el tiempo de tratamiento adecuados para su caso.

Las dosis usualmente recomendadas de FERROMALT son las siguientes:

Prevención de la anemia ferropénica

La dosis ponderal es de 1 mg/kg/día de hierro elemental.

- Niños de 6 a 24 meses: 5 gotas al día.
- Niños de 2 a 12 años: 10 gotas o 2,5 ml del jarabe al día.
- Adolescentes y adultos y mujeres embarazadas: 5 ml del jarabe al día.

Tratamiento de la anemia ferropénica

- Niños menores de 2 años: 10 gotas al día.
- Niños de 2 a 12 años: 20 gotas o 5 ml del jarabe al día.
- Adolescentes y adultos: 10 a 20 ml del jarabe, o el contenido de 1 a 2 viales al día.
- Mujeres embarazadas: el médico ajustará la dosis de acuerdo a las necesidades de cada paciente.

La dosis de FERROMALT debe tomarse de preferencia junto con las comidas, y puede administrarse sola o mezclada con agua o jugos de frutas.

SOBREDOSIS

En caso de una sobredosis masiva acuda al centro de salud más cercano. La sobredosis con suplementos de hierro puede manifestarse con síntomas tales como debilidad, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas o estreñimiento.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor de 30 °C, protegido de la luz y la humedad.

Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Si los síntomas persisten consulte a sus médico

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

PRESENTACIONES

Ferromalt Jarabe 50 mg/5 ml, frasco por 150 ml
Ferromalt Gotas 50 mg/ml, frasco por 30 ml
Ferromalt Viales 100 mg/5 ml, caja x 10 viales de 5 ml

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Mayo del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com