

HCT[®] 25

Hidroclorotiazida

Tabletas de 25 mg

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Lea cuidadosamente el siguiente folleto. Contiene información resumida acerca del producto. Consulte con su médico cualquier duda adicional que tenga con respecto al uso de este medicamento.

COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene:

Hidroclorotiazida.....25 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, lactosa, almidón pregelatinizado, estearato de magnesio, polivinilpirrolidona, laca aluminica roja.

GRUPO TERAPÉUTICO

Diurético tiazídico

DESCRIPCIÓN

HCT[®]25 contiene como principio activo a la hidroclorotiazida, un medicamento que hace que sus riñones produzcan una mayor cantidad de orina, lo que ayuda a su cuerpo a eliminar cantidades excesivas de sal y agua en su organismo.

INDICACIONES

HCT[®]25, está indicado en el tratamiento crónico de la hipertensión arterial y en condiciones en las que existen cantidades excesivas de líquidos en el organismo, incluyendo insuficiencia cardiaca, enfermedades del hígado e insuficiencia renal.

CONTRAINDICACIONES

HCT[®]25 está contraindicado en pacientes con antecedentes de alergia a la hidroclorotiazida y a las sulfonamidas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de tomar **HCT[®]25** informe a su médico acerca de cualquier alergia o otra condición médica que usted tenga, especialmente si usted sufre de diabetes, gota, enfermedades del riñón o del hígado, lupus eritematoso.

Embarazo y lactancia: **HCT[®]25** sólo debe usarse

en el embarazo en aquellos casos en que los beneficios potenciales del tratamiento superen los riesgos.

Si usted está dando de lactar, consulte con su médico antes de iniciar el tratamiento con **HCT[®]25**.

Precauciones especiales: Este medicamento puede producir somnolencia. No conduzca ni realice actividades que requieran un gran nivel de alerta hasta que usted esté seguro de que puede llevar a cabo dichas actividades con seguridad.

EFFECTOS ADVERSOS

Mientras su organismo se ajusta el tratamiento con **HCT[®]25** pueden haber molestias tales como malestar abdominal, mareos o dolores de cabeza. Si alguno de estos efectos persiste o empeora, consulte prontamente con su médico. Consulte con su médico de inmediato si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con **HCT[®]25**: calambres o debilidad muscular, palpitaciones, disminución del volumen de orina, boca seca o sed excesiva, visión borrosa o dolor ocular.

Para evitar el riesgo de mareos, al levantarse de la cama o de una posición sentada, hágalo despacio.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis y el tiempo de tratamiento dependen de su condición específica y el criterio de su médico.

En la hipertensión, la dosis usualmente recomendada es de una tableta una vez al día.

En el tratamiento del edema, la dosis puede variar de 25 mg a 100 mg al día, en una o dos tomas.

No se debe tomar más de 200 mg de hidroclorotiazida en 24 horas.

Los pacientes con enfermedades renales deben seguir las instrucciones de su médico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VÍA ORAL

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La colestiramina y el colestipol pueden disminuir la absorción de la hidroclorotiazida. Si usted está en tratamiento con alguno de estos medicamentos, tómelos al menos 4 horas antes o 4 horas después de la dosis de **HCT®25**.

Entre los medicamentos que pueden interactuar con la hidroclorotiazida están la cisaprida, el litio, la carbamazepina, y la tretinoína. Informe a su médico acerca de cualquier medicina que usted esté tomando antes de comenzar su tratamiento con **HCT®**.

CONSEJOS DE USO

Tome las tabletas de **HCT®25** de acuerdo a las instrucciones de su médico, por lo general una vez al día en las mañanas, con o sin las comidas. Si lo toma en la noche, es preferible que tome el medicamento al menos cuatro horas antes de acostarse, para evitar que usted deba levantarse a orinar. Evite la exposición prolongada al sol.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis con **HCT®25** acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis aguda con hidroclorotiazida se incluyen: mareo severo, debilidad, desmayos.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

HCT® 25, tabletas de 25 mg, caja por 30 Tabletatas.

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión del Prospecto:
Julio del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com