

# HAPECO® Gel

## Suplemento multivitamínico

### FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

### COMPOSICIÓN

Principios Activos:

Cada 5 g del gel contienen:

Vitamina A palmitato.....	667 UI
Vitamina B <sub>1</sub> (clorhidrato de tiamina).....	0,35 mg
Vitamina B <sub>2</sub> (fosfato de riboflavina).....	0,547 mg
Vitamina B <sub>3</sub> (nicotinamida) .....	4,5 mg
Vitamina B <sub>6</sub> (clorhidrato de piridoxina).....	0,50 mg
Vitamina C (ácido ascórbico).....	20 mg
Vitamina D <sub>3</sub> .....	200 UI
Vitamina E .....	4,5 mg

Excipientes: sabor naranja, metilparabeno, propilparabeno, sacarosa, glucosa, sucralosa, goma xantham, sorbitol, glicerina, benzoato de sodio, edetato de sodio, ácido cítrico, citrato de sodio, agua purificada, simeticona emulsión.

### GRUPO TERAPÉUTICO

Suplemento multivitamínico

### DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

HAPECO Gel contiene una combinación de vitaminas liposolubles e hidrosolubles en concentraciones apropiadas para la prevención de estados de carencia vitamínica y para el apoyo en el desarrollo físico y mental en niños y jóvenes en etapa de crecimiento, mujeres embarazadas y dando de lactar.

### CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.

### ADVERTENCIAS

No ingiera dosis mayores que las recomendadas, salvo que su médico se lo indique.

Este producto no esta recomendado para niños menores de 2 años.

### EFFECTOS ADVERSOS

HAPECO Gel suele ser muy bien tolerado, y no se reportan efectos adversos específicos al uso de los componentes de la fórmula. Si usted experimenta alguna molestia durante el tratamiento con HAPECO Gel, infórmelo a su médico.

### DOSIS USUAL

En general, la dosis recomendada para niños de 2 a 12 años es de una cucharadita dos veces al día.

## **SOBREDOSIS**

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

## **CONSEJOS DE USO**

HAPECO Gel puede administrarse con o sin las comidas. El gel puede ingerirse puro o mezclado con cereal, frutas o yogurt.

## **VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VÍA ORAL**

## **ALMACENAMIENTO**

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, a una temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

## **VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL**

## **PRESENTACIONES**

HAPECO Gel, tubo por 50 y 100 gramos  
Caja x 12 sachet / 10 g.

Venta Libre

## **Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Julio del 2021

