

HAPECO PLUS®

Suplemento multivitamínico

Cápsulas, jarabe

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

Vitamina C (ácido ascórbico)	100 mg
Vitamina B ₁ (clorhidrato de tiamina)	10 mg
Vitamina B ₂ (riboflavina)	5 mg
Vitamina B ₆ (clorhidrato de piridoxina)	2 mg
Vitamina B ₁₂ (cianocobalamina)	0,010 mcg
Nicotinamida	42,5 mg
Pantotenato de calcio	10 mg
Ácido fólico	0,5 mg

Excipientes: lactosa, estearato de magnesio.

Cada 5 ml del jarabe contienen:

Vitamina B ₁ (clorhidrato de tiamina).....	5 mg
Vitamina B ₂ (riboflavina)	1 mg
Vitamina B ₆ (clorhidrato de piridoxina)	4 mg
Vitamina B ₁₂ (cianocobalamina)	5 ug
Nicotinamida	10 mg
Pantotenato de calcio	3 mg
Ácido fólico	0,25 mg
Vitamina C (ácido ascórbico)	25 mg

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, sorbitol solución, alcohol etílico, propilenglicol, esencia de banano, esencia de vainilla, sacarosa, benzoato de sodio, hidróxido de sodio, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Suplemento multivitamínico

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

HAPECO PLUS® contiene una combinación de vitamina C, vitaminas del complejo B y ácido fólico en concentraciones apropiadas para la prevención y el tratamiento de estados de carencia vitamínica. Como suplemento multivitamínico, está indicado para niños y jóvenes en etapa de crecimiento, mujeres embarazadas y en período de lactancia, ancianos, pacientes en convalecencia, desnutrición o estados de carencias nutricionales, síndromes de malabsorción, ingesta crónica de medicamentos, y todas

aquellas condiciones que requieran un mayor aporte vitamínico en la dieta diaria. Por su concentración de ácido fólico, HAPECO PLUS® está especialmente indicado para la prevención de defectos del desarrollo del sistema nervioso del feto, en conjunto con una dieta adecuada y los controles médicos rutinarios durante el embarazo.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

EFFECTOS ADVERSOS

HAPECO PLUS® cápsulas suele ser muy bien tolerado por la mayoría de los pacientes y no se reportan efectos adversos específicos al uso de los componentes de la fórmula. Si usted experimenta alguna molestia durante el tratamiento con HAPECO PLUS®, infórmelo a su médico.

DOSIS USUAL

Cápsulas

En adolescentes y adultos, una cápsula una vez al día.

Jarabe

En niños de 3 a 12 años: media cucharadita una vez al día.

En adolescentes y adultos: una a dos cucharaditas al día, en una o dos tomas.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

CONSEJOS DE USO

La dosis de HAPECO PLUS® puede administrarse con o sin las comidas. Ingiera la cápsula entera con un poco de líquido, sin romperla ni masticarla.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VÍA ORAL

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad, lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

PRESENTACIONES

HAPECO PLUS® Cápsulas,
caja x 24 cápsulas.

HAPECO PLUS® Jarabe,
frasco x 120 ml

HAPECO PLUS® Jarabe,
frasco x 240 ml

Venta Libre

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Febrero del 2016



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com

Hapeco Zinc

Suplemento multivitamínico

JARABE

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada 5 ml del jarabe contienen:

Vitamina A palmitato	2000 UI
Clorhidrato de tiamina (vitamina B ₁)	5 mg
Fosfato de riboflavina (vitamina B ₂)	1 mg
Nicotinamida (vitamina B ₃)	10 mg
Pantotenato de calcio (vitamina B ₅)	3 mg
Clorhidrato de piridoxina (vitamina B ₆)	4 mg
Ácido fólico (vitamina B ₉)	200 mcg
Cianocobalamina (vitamina B ₁₂)	5 mcg
Ácido ascórbico (vitamina C)	25 mg
Gluconato de zinc (equivalentes a 5 mg de zinc)	34,85 mg

Excipientes: Sorbitol, cremophor, propilenglicol, propilparabeno, butilhidroxitolueno, metilparabeno, sacarosa, benzoato de sodio, hidróxido de sodio, alcohol etílico, esencia de banano, esencia de vainilla, agua purificada.

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

HAPECO ZINC es un complemento nutricional que contiene una combinación de vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C y zinc en concentraciones apropiadas para complementar el consumo de nutrientes de la dieta diaria. Junto con una dieta apropiada, HAPECO ZINC ayuda al mantenimiento de un buen estado nutricional y permite prevenir y corregir estados de deficiencias de vitaminas A, B, C y zinc. HAPECO ZINC está especialmente indicado para niños y jóvenes en crecimiento, mujeres embarazadas o dando de lactar, personas con dietas especiales, pacientes de la tercera edad, pacientes con desnutrición o síndromes de malabsorción, y en general para todas aquellas condiciones que requieran de un mayor aporte de micronutrientes en la dieta diaria.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES

Si usted sufre de alguna alergia o tiene alguna condición médica por la que está siendo tratado, consulte a su médico antes de comenzar a tomar HAPECO ZINC.

Uso durante el embarazo: En general es seguro administrar HAPECO ZINC a las dosis recomendadas durante el embarazo y la lactancia. En todo caso, y como sucede con cualquier medicamento, el uso de suplementos de vitaminas y minerales durante el embarazo y la lactancia debe hacerse siempre de acuerdo a las instrucciones del médico y sin superar las dosis recomendadas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Antes de iniciar el tratamiento con HAPECO ZINC informe a su médico acerca de cualquier medicamento, suplemento nutricional o producto natural que usted esté tomando. En ocasiones el zinc puede interferir con la absorción de ciertos medicamentos. Si usted está en tratamiento con algún antibiótico, su médico puede recomendarle que tome el HAPECO ZINC al menos dos horas antes o dos horas después de haber tomado la dosis del antibiótico.

EFECTOS ADVERSOS

HAPECO ZINC suele ser muy bien tolerado por la mayoría de los pacientes. En raras ocasiones pueden darse efectos tales como náuseas o molestias abdominal, por lo general leves y de corta duración. Informe a su médico en caso de experimentar alguna molestia durante el tratamiento con HAPECO ZINC.

DOSIS USUAL

La dosis recomendada de HAPECO ZINC es de 1 cucharadita (5 ml) una vez al día, preferiblemente con el estómago vacío.

SOBREDOSIS

En caso de una sobredosis masiva acuda al centro de salud más cercano.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL PRESENTACIÓN

HAPECO ZINC jarabe, caja-frasco por 120 ml y caja-frasco por 240 ml.

Venta por Receta Médica.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este
Prospecto: Junio del 2021