

# LORATADINA

## Tabletas, jarabe

### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

### COMPOSICIÓN

#### Cada tableta recubierta contiene:

Loratadina ..... 10 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, almidón de maíz, estearato de magnesio, solución cubierta: opadry blanco, \* alcohol, desaparece durante el proceso de manufactura.

#### Cada 5 ml del jarabe contienen:

Loratadina ..... 5 mg

Excipientes :Benzoato de sodio, propilenglicol, ácido cítrico, glicerina, sacarosa, esencia de banano, agua purificada.

### GRUPO TERAPÉUTICO

Antihistamínico H1

### DESCRIPCIÓN

La loratadina es un bloqueante de los receptores de tipo H1 sin acción sedante, indicado para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica y para el tratamiento de la urticaria idiopática crónica en pacientes mayores de 2 años de edad.

### CONTRAINDICACIONES

Este producto no debe ser usado por pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la loratadina.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de tomar esta medicación, informe a su médico sobre cualquier alergia u otro problema de salud que usted tenga o haya tenido, especialmente enfermedades del hígado o riñón.

**Uso en el embarazo y la lactancia:** Si usted está embarazada o dando de

lactar, utilice loratadina sólo bajo supervisión y estricto control por parte de su médico.

**Uso en niños:** La loratadina no está indicada en pacientes menores de 2 años.

**Precauciones especiales:** La loratadina por lo general no causa somnolencia. Sin embargo, evite conducir o realizar actividades que requieran un gran nivel de alerta hasta que usted tenga la seguridad de que puede hacer esas actividades con seguridad.

### EFFECTOS ADVERSOS

La loratadina usualmente no causa efectos adversos, aunque en ciertos pacientes, especialmente ancianos, puede producirse somnolencia. Si usted experimenta alguna molestia durante el tratamiento con la Loratadina, infórmelo a su médico.

## **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

Si usted está tomando medicamentos antigripales o antitusígenos, revise la composición de estos productos. En muchos casos contienen otros antihistamínicos, que pueden incrementar su riesgo de efectos adversos.

## **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**

Las dosis de la loratadina son las siguientes:

- **Adultos y niños mayores de 6 años:** una tableta de 10 mg o 10 ml del jarabe, una vez al día.
- **Niños de 2 a 6 años:** una cucharadita (5 ml), una vez al día.

En los pacientes con insuficiencia renal o hepática, la dosis de inicio en mayores de 6 años es de 10 mg en días alternos, y de 5 mg en días alternos en niños menores de 6 años.

## **CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN**

Las tabletas de LORATADINA pueden deglutirse enteras con un poco de agua.

## **SOBREDOSIS**

La ingestión accidental o voluntaria de dosis excesivas de LORATADINA (más de 10 mg al día) puede producir somnolencia, taquicardia, síntomas extrapiramidales y palpitaciones.

En caso de sobredosis, acuda de inmediato al centro de salud más cercano.

## **ALMACENAMIENTO**

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**Vía de Administración: Oral**

## **PRESENTACIONES**

**LORATADINA** Tabletas de 10 mg, caja x 30 Tabletas

**Venta Libre**

**LORATADINA** Jarabe de 5 mg/5 ml, caja frasco x 120 ml

**LORATADINA** Jarabe de 5 mg/5 ml, caja frasco x 60 ml

**Venta bajo receta médica**

**Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión del Prospecto:  
Mayo 2021



# **Rocnarf**

Experiencia y Compromiso en  
Medicamentos de Calidad

**[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)**