

LOSARTAN

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente,

Por favor lea cuidadosamente este Folleto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda o inquietud adicional, consulte siempre con su médico.

Precaución para el Uso en el Embarazo: Riesgo de Toxicidad Fetal

Si usted está embarazada o supone estarlo, suspenda de inmediato el tratamiento con este medicamento y consulte con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene 50 mg losartán potásico.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antihipertensivo bloqueador de los receptores de la angiotensina II

DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

El losartán es un agente antihipertensivo del grupo de los antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II, que actúa bloqueando la acción de la angiotensina II, una hormona con un potente efecto vasoconstrictor.

INDICACIONES

- Hipertensión arterial, sólo o combinado con otros antihipertensivos.
- Hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos.
- Nefropatía en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

CONTRAINDICACIONES

Este medicamento no debe ser empleado por mujeres embarazadas ni por pacientes con antecedentes de alergia al losartán. No debe administrarse conjuntamente con aliskirén en pacientes diabéticos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe a su médico acerca de cualquier medicina que usted esté tomando, especialmente aliskirén, diuréticos ahorradores de potasio (p.ej., espironolactona), antihipertensivos inhibidores de la ECA (p.ej., enalapril), antiinflamatorios no esteroideos, suplementos de potasio o litio.

ADVERTENCIAS

Antes de iniciar el tratamiento comunique a su médico cualquier problema de salud que usted pueda tener, especialmente si tiene o ha tenido alguna de las siguientes condiciones: insuficiencia cardíaca, estenosis de las arterias renales, antecedentes de enfermedades del riñón o del hígado, hiperkalemia (elevación del potasio sérico) o alergias a medicamentos.

Si usted presenta erupciones en la piel o alguna otra reacción de tipo alérgico, suspenda el tratamiento y consulte con su médico.

Embarazo y lactancia: Si usted está embarazada o supone estarlo, suspenda inmediatamente el tratamiento con losartán.

En el período de lactancia el losartán deben ser administrado sólo bajo estricta supervisión médica.

EFECTOS ADVERSOS

El losartán suele ser bien tolerado por la mayoría de los pacientes. La mayoría de los efectos adversos suelen ser leves y no requieren la interrupción del tratamiento. Entre las molestias reportadas más frecuentemente se encuentran: cansancio, hipoglicemia, dolor de pecho, tos, diarreas, hipotensión, mareos o náuseas. Si estas o alguna otra molestia asociada con el uso de estos medicamentos persiste por varios días o empeora, consulte con su médico.

DOSIS

- Hipertensión arterial: la dosis usual de inicio es de una tableta de 50 mg una vez al día, que en caso necesario puede aumentar hasta un máximo de dos tabletas de al día.
- Hipertrofia ventricular izquierda: la dosis usual de inicio es de una tableta de 50 mg una vez al día, aumentándose luego a dos tabletas una vez al día.
- Nefropatía en pacientes diabéticos tipo 2: la dosis usual de inicio es de una tableta de 50 mg una vez al día, pudiendo aumentarse luego a dos tabletas una vez al día.

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Las tabletas de losartán puede tomarse con o sin las comidas. Deben deglutirse sin masticar, con abundante líquido. Tome la dosis indicada por su médico todos los días, a la misma hora. Si olvidó tomar la dosis y no han pasado muchas horas, tómela apenas lo recuerde. Si ya se encuentra cerca de la hora de la siguiente dosis, espere hasta tomar la nueva dosis.

SOBREDOSIS

No se dispone de abundante información con

respecto a la sobredosis con losartán. En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES

LOSARTAN 50 mg TABLETAS, caja x 30.
Venta Bajo Receta Médica.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. de las Américas N° 100 y Calle 7ª
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Abril del 2016



www.rocnarf.com