

# **METRONIDAZOL DC**

## Suspensión de 250 mg/5 ml

### **FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

### **COMPOSICIÓN:**

Cada 5 ml de la suspensión contiene 250 mg de metronidazol.

Excipientes: metilparabeno, goma xantham, glicerina, propilparabeno, sorbitol solución, alcohol etílico, sacarina sódica, esencia de durazno, sacarosa, color amarillo FD&C 6 solución 5%, agua purificada.

### **GRUPO TERAPÉUTICO**

Antiprotozoario.

### **DESCRIPCIÓN**

El metronidazol es un medicamento perteneciente al grupo de los antimicrobianos nitroimidazólicos, indicado para el tratamiento de varios tipos de infecciones causadas por bacterias y por protozoos.

### **INDICACIONES, DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN**

Su médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso. En general, las indicaciones recomendadas y las dosis usuales para estas indicaciones en niños son las siguientes:

- Amebiasis: 35 a 50 mg/kg/día, divididos en tres tomas al día, por 10 días.
- Giardiasis: 15 mg/kg/día, divididos en tres tomas al día, por 7 días.

Su médico puede recetarle metronidazol para indicaciones no incluidas en este inserto.

### **CONTRAINDICACIONES**

No use este producto si usted tiene antecedentes de alergia al metronidazol. Contraindicado durante el primer trimestre del embarazo.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Antes de iniciar el tratamiento con metronidazol informe a su médico si usted tiene alguna alergia o cualquier otro problema de salud, especialmente enfermedades del hígado, problemas neurológicos (como convulsiones), enfermedades de la sangre, enfermedad de Crohn.

No ingiera bebidas alcohólicas mientras está en tratamiento con esta medicina y por lo menos por 1 día después de su finalización. El consumo de alcohol durante el tratamiento con metronidazol puede causar dolores o calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y enrojecimiento.

### **EFFECTOS ADVERSOS**

En ocasiones, durante el tratamiento con metronidazol puede haber la aparición de molestias tales como mareos, dolor de cabeza, diarreas, náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito, estreñimiento, sabor metálico en la boca y boca seca. Si cualquiera de estas molestias persiste por más de unos pocos días o empeora, consulte con su médico.

El metronidazol puede oscurecer la orina, lo cual es un efecto normal del medicamento y que no reviste peligro.

Informe a su médico de forma inmediata si se presentase alguno de estos raros pero posibles y graves efectos adversos: falta de equilibrio, convulsiones, confusión, hormigueos o adormecimiento de las manos o los pies, dolor al orinar.

### **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

Antes de iniciar el tratamiento, informe a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando. Entre los medicamentos que pueden interactuar con el metronidazol se encuentran producto que contengan alcohol (como enjuagues bucales o jara- bes para la tos), anticoagulantes orales (como la warfarina), cimetidina, fluorouraci- lo, litio, mebendazol, vacunas con bacterias vivas y algunos medicamentos anticonvul- sivantes (como la fenitoína y el fenobarbital). El metronidazol no puede administrarse conjuntamente con disulfiram. Se debe evitar el uso de disulfiram durante las dos semanas anteriores o posteriores al tratamiento con metronidazol.

### **CONSEJOS DE USO**

Se recomienda administrar el metronidazol con estómago lleno o con un vaso de leche, para minimizar las molestias digestivas. Tome este medicamento a la misma hora todos los días, por el tiempo que su médico señale.

No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento con metronidazol.

### **SOBREDOSIS**

En caso de sobredosis se debe acudir de forma urgente al centro de salud más cerca- no. Entre los síntomas de una sobredosis con metronidazol se incluyen náuseas, vómitos, mareos y convulsiones.

### **ALMACENAMIENTO**

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración oral

### **PRESENTACIÓN**

Metronidazol Suspensión 250 mg/5 ml, frasco x 120 ml

### **Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. de las Américas N° 100 y Calle 7ª  
Guayaquil - Ecuador

### **VENTA BAJO RECETA MEDICA.**

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Febrero del 2017



**[www.rocnarf.com](http://www.rocnarf.com)**