

MIXDERM®

Clotrimazol, Neomicina y Betametasona.

Crema antimicótica, antibacteriana y antiinflamatoria.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente,

Por favor lea cuidadosamente este Folleto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda o inquietud adicional, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de la crema contienen:

Principios Activos:

Clotrimazol 1,00 g

Neomicina 0,5 g

Betametasona 0,04 g

Excipientes: aceite mineral, vaselina sólida blanca, cetomacrogol, alcohol cetoestearílico, metilparabeno, propilparabeno, fosfato sodio monobásico monohidratado, fosfato dibásico de sodio anhidro, propilenglicol, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antimicótico, antibacteriano y antiinflamatorio tópico

DESCRIPCIÓN

MIXDERM® contiene una combinación tres principios activos: el **clotrimazol**, un antimicótico azólico; la **neomicina**, un antibiótico aminoglucósido; y la **betametasona**, un corticoesteroide sintético de alta potencia, con efectos antiinflamatorio, antiprurítico y vasoconstrictor.

La combinación de estos tres agentes hace de MIXDERM® un medicamento muy eficaz para el tratamiento de las dermatosis complicadas o no con infección secundaria, y para las infecciones micóticas o bacterianas de la piel acompañadas de inflamación y prurito.

INDICACIONES Y DOSIS

En pacientes adultos y mayores de 12 años, las indicaciones y dosis recomendadas son las siguientes:

- Tratamiento de la tiña del cuerpo o de la ingle: aplíquese una capa fina sobre el

área afectada dos veces al día por una semana. No use vendajes oclusivos. Si no hay mejoría al cabo de una semana, consulte con su médico. No use la crema por más de dos semanas.

- Tratamiento de la tiña del pie: aplíquese una cantidad suficiente de la crema, masajeando el área afectada, dos veces al día por dos semanas. No use vendajes oclusivos. Si no hay mejoría al cabo de dos semanas, consulte con su médico. No use la crema por más de cuatro semanas.
- Dermatitis de contacto, dermatitis atópica, dermatitis alérgica y otras dermatosis, con o sin infección bacteriana secundaria: aplíquese una capa fina sobre el área afectada, una a dos veces al día, preferiblemente después de bañarse, y masajee hasta la completa disolución de la crema. No use vendajes oclusivos, salvo que su médico se lo indique.

CONTRAINDICACIONES

No utilice este producto si usted ha tenido antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES

El tratamiento con MIXDERM® no debe exceder el tiempo indicado en INDICACIONES Y DOSIS. El uso de corticoesteroides tópicos por largo tiempo puede producir efectos no deseados, incluyendo, irritación, foliculitis, hipertrichosis, erupciones acneiformes e hipopigmentación.

En caso de presentarse reacciones de hipersensibilidad, suspender de inmediato el tratamiento. No permitir el contacto de la crema con los ojos.

Embarazo y lactancia. No se ha establecido la seguridad de MIXDERM® en pacientes embarazadas, y su uso durante el embarazo debe limitarse a aquellos casos en que los beneficios esperados sean claramente superiores a los riesgos potenciales. Administrar con precaución durante la lactancia.

Pediatría: Excepto en aquellos casos indicados por el médico, no utilice este producto en niños menores de 12 años.

EFFECTOS ADVERSOS

En raras ocasiones pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad al medicamento, con presencia de enrojecimiento, inflamación, ardor, irritación o prurito en el área de la aplicación. En tales casos debe suspender el tratamiento con MIXDERM® e informar a su médico.

SOBREDOSIS

En caso de ingestión accidental de MIXDERM® crema, acuda al centro de salud más cercano.

CONSEJOS DE USO

MIXDERM® es un producto para uso tópico exclusivamente. No se aplique la crema sobre los ojos o sobre las mucosas oral o vaginal ni sobre áreas muy extensas. Es recomendable lavarse las manos después de la aplicación, salvo el caso de que las manos sean el área tratada. No ingerir. No cubra el área tratada con gasas o vendajes oclusivos, excepto si su médico se lo indica.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Tópica

PRESENTACIONES

MIXDERM®

Crema, tubo x 5, 15, 20, 30, 40 gramos

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5.½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Julio del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com