

# MUCOXIN<sup>®</sup>

## MUCOXIN<sup>®</sup> Junior

## MUCOXIN<sup>®</sup> Relax

### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de comenzar a tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

### COMPOSICIÓN

#### MUCOXIN<sup>®</sup> Solución Oral (Gotas)

Cada 1 ml contiene 7,5 mg de ambroxol clorhidrato.

Excipientes: fosfato dibásico de sodio anhidro, ácido cítrico anhidro, benzoato de sodio, aspartamo, glicerina, propilenglicol, sorbitol, esencia de vainilla, alcohol etílico, agua purificada.

#### MUCOXIN<sup>®</sup> Jarabe

Cada 5 ml del jarabe contienen 15 mg de ambroxol clorhidrato.

Excipientes: fosfato de sodio, ácido cítrico anhidro, aspartamo, glicerina, propilenglicol, sorbitol, metilparabeno, alcohol etílico, esencia de vainilla, agua purificada.

#### MUCOXIN<sup>®</sup> Junior

Cada 5 ml del jarabe contienen 15 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.

Excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, ácido cítrico anhidro, glicerina, sorbitol, sacarosa, esencia de cereza, color rojo FD&C 40, agua purificada.

#### MUCOXIN<sup>®</sup> Relax

Cada 5 ml del jarabe contienen 30 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.

Excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, ácido cítrico anhidro, glicerina, sorbitol, sacarosa, esencia de banano líquida, agua purificada.

Cada tableta contiene 30 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.

Excipientes: almidón de maíz, lactosa, estearato de magnesio.

### GRUPO TERAPÉUTICO

Mucolítico, antihistamínico.

irritativa, incluyendo resfriado común, rinitis alérgica, bronquitis, faringitis, sinusitis aguda y asma bronquial.

### DESCRIPCIÓN

MUCOXIN jarabe y gotas contiene como principio activo ambroxol, un agente mucolítico y expectorante que estimula la síntesis de un moco respiratorio más abundante y fluído, facilitando su eliminación por medio de la tos.

MUCOXIN RELAX y MUCOXIN JUNIOR contienen como principios activos ambroxol y loratadina. La loratadina es un fármaco antihistamínico H1 no sedante, muy eficaz para el alivio de la congestión nasal, la rinorrea, el lagrimeo y los estornudos.

### INDICACIONES CLÍNICAS

MUCOXIN: Coadyuvante en el tratamiento de la bronquitis aguda, traqueobronquitis, bronquitis crónica, asma bronquial, enfisema y otras condiciones respiratorias caracterizadas por la presencia de mucosidad respiratoria espesa y de difícil expectoración.

MUCOXIN RELAX, MUCOXIN JUNIOR:

Coadyuvantes en el tratamiento de afecciones respiratorias altas acompañadas de congestión nasal, estornudos, tos y mucosidad respiratoria espesa e

### CONTRAINDICACIONES

MUCOXIN jarabe y gotas: Antecedentes de alergia al ambroxol.

MUCOXIN RELAX, MUCOXIN JUNIOR: Antecedentes de alergia al ambroxol o a la loratadina.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento informe a su médico acerca de cualquier condición médica o alergias que usted tenga o haya tenido. El ambroxol debe administrarse con precaución a pacientes con úlcera péptica activa o antecedentes de úlcera.

**Uso durante el embarazo o la lactancia:** Si usted está embarazada o dando de lactar, consulte a su médico antes de tomar cualquiera de los medicamentos descritos en este inserto.

**Uso en Pediatría:** MUCOXIN JARABE, MUCOXIN JUNIOR y MUCOXIN RELAX están indicados solo para niños mayores de 2 años de edad.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuníquese a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, incluso aquellos que no requieran receta médica.

## EFFECTOS ADVERSOS

En raras ocasiones pueden producirse molestias tales como dolor de cabeza, somnolencia, dolor abdominal o diarreas, por lo general leves y autolimitadas.

Si estas o alguna otra molestia no cesan o empeoran con el paso de los días, o si usted experimenta cualquier reacción alérgica tales como ronchas en la piel, picazón o dificultad para respirar, consulte prontamente con su médico.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis y el tiempo de tratamiento dependen de su condición específica y el criterio de su médico. Las dosis recomendadas son las siguientes:

### MUCOXIN GOTAS 7,5 mg/ml

- Niños de 6 meses a 2 años: 1 ml (20 gotas) dos veces al día.
- Niños de 2 a 5 años: 1 ml (20 gotas) tres veces al día.

### MUCOXIN JARABE 15 mg/5 ml

- Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cucharadita) tres veces al día.
- Niños de 6 a 12 años: 5 ml (una cucharadita) tres veces al día.

### MUCOXIN JUNIOR JARABE

- Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cucharadita) dos veces al día.
- Niños de 6 a 12 años: 5 ml (una cucharadita) dos veces al día.

### MUCOXIN RELAX JARABE

- Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cucharadita) dos veces al día.
- Mayores de 6 años y adultos: 5 ml (una cucharadita) dos veces al día.

### MUCOXIN RELAX TABLETAS

- Mayores de 6 años y adultos: una tableta dos veces al día.

Las gotas pueden administrarse directamente o diluidas en un poco de agua.

## SOBREDOSIS

En caso de una sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis con loratadina se encuentran el dolor de cabeza, las palpitaciones y la somnolencia.

## ALMACENAMIENTO

Conserve este medicamento en su envase original, a una temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad y lejos del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**Vía de Administración: Oral**

**Conservar a temperatura no mayor a 30°C.**

## PRESENTACIONES

MUCOXIN® Gotas, frasco por 30 ml  
MUCOXIN® Jarabe, frasco por 120 ml  
MUCOXIN® JUNIOR Jarabe, frasco por 120 ml  
MUCOXIN® RELAX Jarabe, frasco por 120 ml  
MUCOXIN® RELAX Tabletas, caja por 30

Venta Bajo Receta Médica.

**Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:  
Junio del 2021



**www.rocnarf.com**