

OMEPRAZOL

Cápsulas de 20 mg y 40 mg

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene 20 mg y 40 mg de omeprazol microgranulado.

CLASE TERAPÉUTICA

Antiulceroso inhibidor de la bomba de protones

DESCRIPCIÓN

El omeprazol es un agente perteneciente al grupo de los inhibidores de la bomba de protones que actúa disminuyendo la secreción de ácido clorhídrico en el estómago.

INDICACIONES Y DOSIS

Su médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso. En general, las indicaciones recomendadas y las dosis usuales para estas indicaciones en pacientes adultos son las siguientes:

- Tratamiento de corto plazo de la úlcera duodenal activa: 20 mg una vez al día por 4 a 8 semanas.
- Erradicación de la infección por H pylori: 20 mg una vez al día, en conjunto con 500 mg de claritromicina y 1000 mg de amoxicilina dos veces al día por 10 días. Luego de finalizado este esquema, continuar omeprazol por 2 semanas más.
- Úlcera gástrica: 40 mg una vez al día por 4 a 8 semanas.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico: 20 mg una vez al día por 4 semanas. En pacientes con esofagitis erosiva la dosis recomendada es de 20 mg al día por 4 a 8

semanas.

- Terapia de mantenimiento en pacientes con esofagitis erosiva: 20 mg una vez al día.
- Condiciones de hipersecreción patológica de ácido: La dosis varía de acuerdo a cada paciente. La dosis de inicio recomendada es de 60 mg una vez al día.

CONTRAINDICACIONES

No tome este medicamento si usted tiene antecedentes de alergia al omeprazol o a otros inhibidores de la bomba de protones tales como esomeprazol, lanzoprazol o pantoprazol.

ADVERTENCIAS

Antes de iniciar el tratamiento con omeprazol informe a su médico acerca de cualquier alergia u otro problema médico que usted tenga, especialmente enfermedades hepáticas, niveles bajos de magnesio en la sangre u osteoporosis.

Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pueden aumentar el riesgo de fracturas, especialmente a dosis altas y en tratamientos prolongados y en pacientes ancianos.

Uso en el embarazo y la lactancia: Debe evitarse el uso de omeprazol durante el embarazo y la lactancia, salvo casos excepcionales determinados por el médico.

EFFECTOS ADVERSOS

En ocasiones, durante el tratamiento con omeprazol pueden ocurrir molestias tales como dolores de cabeza, dolor abdominal, náuseas, diarreas, vómitos o flatulencia. Si cualquiera de estos efectos persiste por más de unos pocos días o empeora, consulte con su médico.

Informe a su médico de forma inmediata si usted experimenta cualquier reacción grave o inusual durante el tratamiento con este producto.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Antes de iniciar el tratamiento con omeprazol informe a su médico acerca de cualquier otro medicamento que usted esté tomando. Entre los productos que pueden interactuar con el omeprazol están el clopidogrel, metrotexate, nelfinavir, rifampicina, hierba de San Juan.

El omeprazol, puede afectar la absorción de ciertos medicamentos, incluyendo ampicilina, digoxina, suplementos de hierro y ketoconazol, entre otros.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda de forma urgente al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis con omeprazol pueden estar la confusión, sudoración excesiva, visión borrosa y taquicardia.

CONSEJOS DE USO

Tome omeprazol de acuerdo a la instrucciones de su médico, por lo general una vez al día, con el estómago vacío y por lo menos una hora antes de una comida. Ingiera la cápsula entera con algo de líquido, sin masticarla ni romperla.

No tome omeprazol por más de 14 días seguidos a menos que así se lo indique su médico.

ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Guarde este medicamento en su envase original y no lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

PRESENTACIONES

OMEPRAZOL 20 mg, caja por 16 cápsulas.
OMEPRAZOL 20 mg, caja por 24 cápsulas.
OMEPRAZOL 40 mg, caja por 12 cápsulas.
OMEPRAZOL 40 mg, caja por 24 cápsulas.

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. de las Américas N° 100 y Calle 7ª
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión del Prospecto:
Mayo del 2016



www.rocnarf.com