

PARASI-KIT®

Albendazol, secnidazol

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

PARASI-KIT®

Cada TABLETA de ALBENDAZOL contiene 400 mg de albendazol.

Cada TABLETA de SECNIDAZOL contiene 1 g de secnidazol.

PARASI-KIT® PEDIÁTRICO

Cada 20 ml de la suspensión de albendazol contienen 400 mg de albendazol.

Cada 15 ml de la suspensión reconstituida de secnidazol contienen 500 mg de secnidazol.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antihelmínticos y antiprotozoarios

DESCRIPCIÓN

El albendazol es un medicamento antihelmíntico muy eficaz contra una amplia variedad de especies de parásitos helmintos intestinales, incluyendo *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis* y *Taenia sp.*

El secnidazol es un medicamento antiprotozoario indicado en el tratamiento de las parasitosis intestinales causadas por los protozoos

Entamoeba histolytica y *Giardia lamblia*.

La combinación del albendazol y el secnidazol en una sola presentación comercial facilita el tratamiento integral de las parasitosis intestinales mixtas, con presencia simultánea de helmintos y protozoos, tanto en niños como en adultos.

INDICACIONES Y DOSIS

Para el tratamiento integral de las parasitosis intestinales mixtas con presencia de helmintos y protozoos se recomienda el siguiente esquema de tratamiento:

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

PARASI-KIT®

En pacientes adultos o con peso mayor de 30 kg:

- Día 1: una tableta masticable de 400 mg de albendazol.
- Día 2: dos tabletas de 1 g de secnidazol, en una o dos tomas, de mañana y de noche.

PARASI-KIT® PEDIÁTRICO

PARASI-KIT® PEDIÁTRICO está formulado para niños con hasta 15 kg de peso.

- Día 1: administrar 20 ml de la suspensión de albendazol (todo el contenido del envase).
- Día 2: En niños con hasta 15 kg de peso, administrar 15 ml de la suspensión reconstituida de secnidazol (todo el contenido del envase).

Los niños con más de 15 kg de peso requieren una dosis mayor a la contenida en la presentación de PARASI-KIT® PEDIÁTRICO.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de reacciones alérgicas al albendazol o al secnidazol.

Embarazo o sospecha de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuníquese a su médico sobre cualquier otro medicamento que usted esté recibiendo, especialmente dexametasona, teofilina, cimetidina, praziquantel, warfarina y disulfiram.

ADVERTENCIAS

Antes de iniciar el tratamiento con PARASI-KIT® informe a su médico acerca de cualquier problema de salud que usted tenga, especialmente anemia u otras enfermedades de la sangre, disfunción hepática o problemas biliares, insuficiencia renal, antecedentes de convulsiones u otros problemas neurológicos.

No ingiera alcohol durante el tratamiento y hasta tres días después de su terminación.

Uso en el embarazo y lactancia: PARASI-KIT® no está indicado para mujeres embarazadas o en sospecha de estarlo.

Se recomienda que las mujeres en edad de concebir realicen el tratamiento durante los primeros siete días del ciclo menstrual, y tomen las medidas anticonceptivas necesarias durante un mes luego del tratamiento.

No se recomienda administrar albendazol durante la lactancia, salvo casos muy especiales en los que los beneficios esperados sean mayores que los riesgos potenciales.

EFECTOS ADVERSOS

En ocasiones, durante o luego del tratamiento con PARASI-KIT®, pueden presentarse molestias tales como dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarreas, cefaleas, erupciones en la piel o alteraciones del gusto. En raros casos puede haber vértigo, parestesias y polineuritis.

Si alguna de estas molestias se mantiene o empeora con el paso de los días, comuníquelo a su médico. En caso de presentar síntomas o signos de alergia, tales como ronchas en la piel o hinchazón de la cara, suspenda el tratamiento y acuda al centro de salud más cercano.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. Los síntomas de una sobredosis pueden incluir diarrea, náuseas, dolor abdominal, taquicardia.

CONSEJOS E INSTRUCCIONES DE USO

Tome el albendazol y el secnidazol en los días correspondientes, junto con los alimentos y de preferencia con comidas ricas en grasas.

La tableta de albendazol puede deglutirse entera o partirse y masticarse. No tome los dos medicamentos el mismo día.

Para preparar la suspensión de secnidazol:

Invierta y golpee ligeramente el frasco hasta que el polvo quede suelto. Añada agua hervida y fría hasta la flecha indicada en el envase (12 ml). Agite vigorosamente hasta lograr una suspensión de aspecto homogéneo. Hecha la mezcla, la suspensión puede conservarse 7 días a temperatura ambiente o 10 días en refrigeración.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES

PARASI-KIT: Cada estuche individual contiene 1 tableta de albendazol de 400 mg y dos tabletas de secnidazol de 1 g. Caja por seis estuches.

PARASI-KIT® PEDIÁTRICO: Cada empaque contiene un frasco de albendazol 400 mg/20 ml y un frasco de secnidazol de 500 mg/15 ml, en polvo para reconstituir.

Venta por Receta Médica.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km. 5½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Julio del 2021



www.rocnarf.com

Rev. 01