

RESPIREX[®]

Loratadina, betametasona

Tabletas y Solución Oral

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: Lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Respirex Tabletas

Cada tableta contiene 5 mg de loratadina y 0,25 mg de betametasona.

Excipientes: celulosa microcristalina PH102, almidón pregelatinizado, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

Respirex Solución Oral

Cada 5 ml de la solución contienen 5 mg de loratadina y 0,25 mg de betametasona.

Excipientes: glicerina, propilenglicol, sacarina sódica, ácido cítrico, benzoato de sodio, esencia cereza, azúcar especial, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antihistamínico y corticoesteroide

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

RESPIREX contiene como principios activos una combinación de loratadina y betametasona.

La loratadina es un bloqueador selectivo de los receptores histamínicos H1, de acción rápida y sin efecto sedante. La betametasona es un corticoesteroide con un potente efecto antiinflamatorio a nivel sistémico.

Se ha demostrado que la combinación de un antihistamínico con un corticoide sistémico a bajas dosis es altamente eficaz para el alivio de la picazón, la obstrucción nasal, el enrojecimiento y otros síntomas característicos de las reacciones alérgicas.

INDICACIONES

RESPIREX está indicado para el alivio a corto plazo de la inflamación, el prurito y otros síntomas alérgicos en pacientes con rinitis alérgica, dermatosis atópica, dermatitis seborreica, neurodermatitis, urticaria, conjuntivitis alérgica, alergias alimentarias y medicamentosas, y reacciones alérgicas severas por picaduras de insectos.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, infecciones micóticas sistémicas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de usar este medicamento informe a su médico acerca de cualquier alergia o condición

médica que usted tenga o haya tenido. Este medicamento debe administrarse con precaución a pacientes con disfunción hepática o renal. Los pacientes con insuficiencia hepática grave deben recibir una dosis menor del medicamento, y la dosis recomendada debe administrarse una sola vez al día. Los corticoesteroides pueden enmascarar algunos signos de infección y su uso puede conducir a la disminución de la resistencia a las infecciones.

Uso durante el embarazo: No se ha establecido la seguridad de la combinación de loratadina y betametasona durante la lactancia. Este medicamento debe administrarse durante el embarazo solo bajo estricta supervisión médica y únicamente en aquellos casos en los que los beneficios esperados superen claramente los riesgos potenciales.

Uso durante la lactancia: La loratadina se excreta por la leche materna. No se recomienda la administración de RESPIREX a mujeres dando de lactar.

Uso en pediatría: Dado que la administración de corticoesteroides puede alterar el ritmo de crecimiento e inhibir la síntesis de corticoides endógenos en lactantes y niños, debe realizarse un seguimiento cuidadoso del crecimiento y desarrollo de los niños que reciban tratamiento prolongado con este medicamento.

Precauciones especiales: No conduzca vehículos ni opere maquinaria pesada hasta estar seguro de que usted puede realizar estas actividades con seguridad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe a su médico acerca de cualquier otro medicamento, suplemento vitamínico o producto natural que usted esté tomando. RESPIREX debe administrarse con precaución a pacientes en tratamiento con fenobarbital, fenitoína, rifampicina, efedrina, estrógenos, diuréticos, glucósidos cardiacos, anfotericina B, aspirina, antidiabéticos orales.

EFFECTOS ADVERSOS

A las dosis recomendadas, RESPIREX es un medicamento generalmente bien tolerado y sin propiedades sedantes significativas. Los efectos adversos más comúnmente reportados son fatiga, dolor de cabeza, somnolencia, nerviosismo, boca seca, náuseas, gastritis y reacciones eruptivas de tipo alérgico. Comuníquese con su médico ante cualquier molestia que no ceda o que empeore con el paso de los días.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Las dosis recomendadas son las siguientes:

Niños de 3 a 6 años: media cucharadita (2,5 ml) dos veces al día.

Niños de 6 a 12 años con peso mayor a 30 kg: una cucharadita (5 ml) dos veces al día.

Adultos y mayores de 12 años: una tableta dos veces al día.

El tratamiento debe limitarse al tiempo que el médico señale. La dosis de RESPIREX debe ajustarse de acuerdo a la severidad de los síntomas y la respuesta de cada paciente, y en casos leves puede ser suficiente la administración de una sola dosis diaria. Luego de tratamientos a largo plazo, el cese de la terapia con RESPIREX debe hacerse de forma gradual, con reducciones progresivas de la dosis.

SOBREDOSIS

Ante cualquier sospecha de sobredosis acuda al centro de salud más cercano. Una sobredosis con este medicamento puede presentarse con síntomas y signos tales como somnolencia, dolor de cabeza y taquicardia.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Vía de Administración: Oral

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES

RESPIREX Tabletas, caja por 10 y por 30 Tabletas
RESPIREX Solución oral, frasco por 60 ml

Venta Bajo Receta Médica

**Elaborado por
Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½
Guayaquil – Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Junio del 2021.



www.rocnarf.com