

# RINOCET

Jarabe

Levocetirizina 2,5 mg/5 ml

Tabletas

Levocetirizina 5 mg

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

## COMPOSICIÓN:

### Rinocet jarabe

Cada 5 ml del jarabe contienen 2,5 mg de Diclorhidrato de Levocetirizina.

Excipientes: sorbitol líquido, glicerina, propilenglicol, sacarina sódica, citrato de sodio, ácido cítrico, metilparabeno, propilparabeno, sabor cereza, alcohol etílico, color rojo FD&C 40, azúcar especial, agua purificada.

### Rinocet 5 mg tabletas

Cada tableta recubierta contiene 5 mg de Diclorhidrato de Levocetirizina.

Excipientes: Celulosa Microcristalina PH102, Almidon Pregelatinizado, Croscarmelosa Sódica, Estearato de Magnesio, **SOLUCIÓN DE CUBIERTA:** Opadry AMB II Azul, Alcohol Etílico\*, Polietilenglicol 3350, Polivinilpirrolidona.

\*Desaparece durante proceso de manufactura.

## GRUPO TERAPÉUTICO

Antihistamínico no sedante

## DESCRIPCIÓN

La levocetirizina es un antihistamínico no sedante de tercera generación derivado de la cetirizina, que actúa por inhibición selectiva de los receptores histamínicos H1.

## INDICACIONES CLÍNICAS

Alivio de los síntomas de la rinitis alérgica y para el tratamiento de las ronchas, la picazón y otras manifestaciones dérmicas no complicadas de la urticaria idiopática crónica.

## CONTRAINDICACIONES

La levocetirizina está contraindicada en personas con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a la levocetirizina o a la cetirizina, pacientes con insuficiencia renal grave y pacientes en hemodiálisis.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

**“No conducir vehículos ni maquinaria si se presenta somnolencia.”**

Antes de iniciar el tratamiento con levocetirizina

informe a su médico acerca de alergias medicamentosas o cualquier problema de salud que usted tenga o haya tenido, especialmente enfermedades renales. Dado que se han reportado casos de retención urinaria durante el tratamiento con levocetirizina, este medicamento debe administrarse con precaución a pacientes con factores que predispongan a retención urinaria, tales como lesiones de la médula espinal o hiperplasia prostática.

**Uso durante el embarazo y la lactancia:** Informe a su médico si usted está embarazada o dando de lactar. Se recomienda suspender la lactancia durante el tratamiento con este medicamento. El uso de la levocetirizina durante el embarazo debe reservarse solo para casos estrictamente necesarios.

**Precauciones especiales:** En algunos casos la levocetirizina puede producir somnolencia o cansancio, por lo que se recomienda que no conduzca vehículos ni realice actividades peligrosas o que requieran de un alto grado de alerta hasta asegurarse que puede hacerlo con seguridad.

## EFECTOS ADVERSOS

La levocetirizina es por lo general bien tolerada y su administración no suele producir efectos adversos significativos. En raros casos pueden darse molestias tales como somnolencia, cansancio o sensación de debilidad. En caso de experimentar retención urinaria suspenda el tratamiento y consulte a su médico.

## INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

No se han evidenciado interacciones farmacológicas significativas de la levocetirizina con otros medicamentos.

## DOSIS USUAL:

Las dosis recomendadas de RINOCET son las siguientes:

### RINOCET JARABE

**Niños de 6 meses a 5 años:** 1,25 mg (2,5 ml del jarabe) una vez al día, en la noche.

**Niños de 6 a 12 años:** 2,5 mg (5 ml del jarabe) una vez al día, en la noche.

Usar el vaso dosificador, para medir la cantidad exacta de jarabe.

### RINOCET 5 mg TABLETAS

**Adultos y mayores de 12 años:** 5 mg (una tableta) una vez al día, en la noche.

No administrar dosis mayores a las indicadas en este prospecto. En casos de insuficiencia renal el médico ajustará la dosis de acuerdo al grado de disfunción renal.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

## CONSEJOS DE USO

Tome la levocetirizina en la noche, con o sin los alimentos. Evite el consumo de alcohol junto con este medicamento y no ingiera dosis mayores a las recomendadas, ya que podría aumentar el riesgo de somnolencia.

## SOBREDOSIS

En caso de una sobredosis con este medicamento acuda al centro de salud más cercano. La sobredosis de levocetirizina en adultos puede causar somnolencia. En niños puede haber una reacción inicial de agitación y posteriormente sueño.

## ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y a una temperatura no mayor a 30°C.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

## PRESENTACIONES

**RINOCET jarabe Levocetirizina 2,5 mg/5 ml,** frasco por 120 ml + Vaso dosificador

**RINOCET Levocetirizina 5 mg tabletas,** caja x 30 tabletas

**Venta bajo receta médica.**

## Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este prospecto:

Marzo 2021

