

SODERMIX®

Crema

- Crema para la prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides.
- Alivio del prurito.
- Restaurador del equilibrio fisiológico de la piel por los efectos de los radicales libres.

COMPOSICIÓN:

Superóxido Dismutasa (SOD) y Catalasa
(Antioxidantes de origen vegetal)

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente:

Por favor lea cuidadosamente este folleto ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este producto. Ante cualquier duda o inquietud adicional, consulte siempre con su médico.

DESCRIPCIÓN:

Un **ANTIOXIDANTE** es una sustancia química que previene el desarrollo de radicales libres y es susceptible de mantener o restaurar la condición fisiológica de la piel humana.

LA CICATRIZ HIPERTRÓFICA Y EL QUELOIDE son patologías o desórdenes fibroproliferativos (cicatrización desordenada) de la dermis, que se presenta solo en humanos y que ocurren después de una cirugía, quemadura, inflamación o cualquier tipo de trauma, y pueden ser estéticamente muy desagradables.

PROPIEDADES:

SODERMIX® posee un modo de acción innovador por su capacidad de restaurar el equilibrio fisiológico de los radicales libres en las células de la epidermis. Contiene un principio activo vegetal patentado rico en antioxidantes, en particular *SOD (Superóxido Dismutasa)* y *Catalasa*. La *SOD* es usada en productos cosméticos para reducir el daño de los radicales libres a la piel, por ejemplo para reducir la fibrosis (cicatrización) que se produce como consecuencia de la radioterapia o en cicatrices hipertróficas o queloides. Las microesferas en su fórmula contienen y protegen el principio activo vegetal que se libera en contacto con la piel, siguiendo la aplicación de la crema.

INDICACIONES:

- Coadyuvante en la prevención y tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides.
- Coadyuvante en la prevención y tratamiento de la fibrosis post-radioterapia.
- Dermatitis pruriginosas.
- Restaurador del equilibrio fisiológico de la piel por efectos de radicales libres.

DOSIS USUAL:

Aplicar SODERMIX® dos veces al día, en la mañana y en la noche, en las zonas afectadas y masajear suavemente. El uso de una crema de día común y/o de maquillaje es posible después de su penetración completa en la piel. Puede incorporarse en fórmulas magistrales con otros elementos activos.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Cicatrices Hipertróficas y Queloides

Tratamiento: De 1 a 6 meses. Mínimo 3 meses, comenzando la aplicación solo cuando la herida esté completamente cerrada.

Fibrosis Post-Radioterapia

Tratamiento: De 3 a 6 meses. Mínimo 3 meses, comenzando la aplicación 3 semanas después del fin de las sesiones de radioterapia.

Prurito

Pudo observarse que el prurito habitualmente desaparece inmediatamente después de la aplicación de SODERMIX®.

Continúe el uso de SODERMIX® Crema hasta que no se vean más mejorías. En condiciones normales de uso, SODERMIX® Crema ha demostrado una notable seguridad de uso y tolerabilidad.

De cualquier forma se recomienda tomar las siguientes precauciones:

- SODERMIX® Crema no debería ser aplicada en heridas abiertas.
- SODERMIX® Crema debería ser aplicada en piel limpia y seca.
- Si se presenta enrojecimiento, dolor o irritación descontinúe el uso y consulte con su médico.
- Mantenga SODERMIX® Crema fuera del alcance de los niños. Sólo para uso externo.

PRESENTACIÓN:

SODERMIX® Crema x 30 g.

DISTRIBUIDO POR



info@cresens.com.ec

ELABORADO POR



www.rocnarf.com

BAJO LICENCIA DE



Life Science Investments Ltd
50, Sloane street
SW1X 9SN London (UK)