

TAZONID®

Nitazoxanida

Tabletas, polvo para suspensión

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Nitazoxanida.....500 mg

Excipientes: celulosa microcristalina PH102, polivinilpirrolidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, alcohol etílico. Solución de cubierta: Opadry amarillo, alcohol etílico*.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

Cada 5 ml de la suspensión reconstituida contienen:

Nitazoxanida.....100 mg

Excipientes: goma xantán, celulosa microcristalina CL611, sacarosa, sacarina sódica, ácido cítrico, benzoato de sodio, esencia de cereza en polvo, color rojo FD&C 40.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antiprotozoario y antihelmíntico

DESCRIPCIÓN

TAZONID contiene nitazoxanida, un medicamento nitrotiazólico activo contra una amplia variedad de parásitos tanto protozoos como helmintos. La acción antiprotozoaria de la nitazoxanida está dada por su capacidad para inhibir la enzima piruvato ferridoxin oxidoreductasa (PFOR). En los helmintos, el medicamento actúa inhibiendo la polimerización de la tubulina.

INDICACIONES

Como antiprotozoario, TAZONID está indicado en el tratamiento de la amebiasis intestinal, la giardiasis y la tricomoniasis vaginal.

Como antihelmíntico, TAZONID está indicado en el tratamiento de las infestaciones causadas por *Enterobius vermicularis*, *Ascaris lumbricoides*, *Strongyloides stercoralis*, *Ancylostoma duodenalis*, *Necator americanus*, *Trichuris trichiura*, *Taenia sp*, *Hymenolepis nana* y *Fasciola hepatica*.

CONTRAINDICACIONES

TAZONID no debe ser administrado a personas con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Informe a su médico acerca de cualquier alergia o problema de salud que usted tenga o haya tenido, especialmente enfermedades del hígado o los riñones.

Uso en el embarazo y la lactancia: No se recomienda el uso de TAZONID durante el embarazo o la lactancia.

Uso en Pediatría: TAZONID no está indicado para menores de 2 años de edad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Antes de iniciar su tratamiento indique a su médico acerca de cualquier otro medicamento que usted esté tomando, especialmente anticoagulantes como la warfarina.

EFFECTOS ADVERSOS

En algunas ocasiones el tratamiento con nitazoxanida puede causar efectos secundarios tales como dolor abdominal, dolor de cabeza, indigestión, vómitos y cambio de la coloración de la orina. Si estas o cualquier otra molestia empeora o no desaparece con el paso de los días, póngase en contacto con su médico.

DOSIS USUAL

Su médico le indicará la dosis y el tiempo de tratamiento adecuados para su caso.

Las dosis usuales para el tratamiento de la amebiasis, giardiasis, tricomoniasis y helmintiasis son:

- En adultos y mayores de 12 años, 1 tableta de 500 mg dos veces al día por tres días. En el caso de la tricomoniasis se recomienda el tratamiento simultáneo de la pareja sexual.
- En niños, una dosis ponderal de 7,5 mg/kg cada 12 horas por tres días.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. Una sobredosis con este medicamento puede acompañarse de síntomas tales como náuseas, vómitos y dolor abdominal.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

PRESENTACIÓN

Tabletas de 500 mg, caja x 12 y 24 tabletas
Suspensión de 100 mg/5 ml, frasco por 60 ml

Venta bajo receta médica.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanka Marengo Km 5 ½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Marzo del 2018



Rocnarf

Laboratorios Farmacéuticos
que Cuidan su Salud

www.rocnarf.com