

ULCIUM®

Esomeprazol

Cápsulas de liberación prolongada de 20 mg y 40 mg

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente,

Por favor lea cuidadosamente este Folleto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda o inquietud adicional, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

ULCIUM® 20

Cada cápsula de liberación prolongada contiene esomeprazol magnesio equivalente a 20 mg de esomeprazol.

ULCIUM® 40

Cada cápsula de liberación prolongada contiene esomeprazol magnesio equivalente a 40 mg de esomeprazol.

CLASE TERAPÉUTICO

Antiulceroso inhibidor de la bomba de protones

DESCRIPCIÓN

ULCIUM® contiene como principio activo al esomeprazol, un agente perteneciente al grupo de los inhibidores de la bomba de protones, que actúa bloqueando de manera rápida y eficaz la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, con lo que alivia los síntomas de la acidez y previene y ayuda a cicatrizar el daño provocado por el ácido en el esófago y el estómago.

INDICACIONES, DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico

Cicatrización de la esofagitis erosiva: 20 a 40 mg una vez al día por 4 a 8 semanas.

Terapia de mantenimiento de la esofagitis erosiva: 20 mg una vez al día.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática: 20 mg una vez al día por 4 semanas.

Reducción del riesgo de úlceras gástricas por consumo de AINEs: 20 a 40 mg una vez al día por hasta 6 meses.

Erradicación del H. pylori para reducir el

riesgo de recurrencias de úlcera duodenal. Terapia Triple simultánea.

- ULCIUM® 40 mg una vez al día por 10 días.
- Amoxicilina 1000 mg dos veces al día por 10 días.
- Claritromicina 500 mg dos veces al día por 10 días.

Estados de hipersecreción ácida, incluyendo síndrome de Zollinger-Ellison

- ULCIUM® 40 mg dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES

No tome este medicamento si usted tiene antecedentes de alergia al esomeprazol o a otros inhibidores de la bomba de protones tales como omeprazol, lanzoprazol o pantoprazol.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Antes de iniciar el tratamiento con ULCIUM® informe a su médico si usted tiene antecedentes de alergia al esomeprazol o a fármacos similares, o cualquier otra condición médica, especialmente enfermedades hepáticas.

Los inhibidores de la bomba de protones, como el esomeprazol, pueden aumentar el riesgo de fracturas, especialmente a dosis alta y en tratamientos prolongados en pacientes ancianos. Su médico puede en ciertos casos prescribirle suplementos de calcio o vitamina D durante el tratamiento.

Uso en el embarazo y la lactancia: **ULCIUM®** no debe ser usado por mujeres embarazadas, salvo casos muy excepcionales determinados por el médico.

El esomeprazol es excretado por la leche materna. Si usted está dando de lactar, comuníquelo a su médico antes de iniciar el tratamiento con **ULCIUM®**.

EFFECTOS ADVERSOS

En ocasiones, durante el tratamiento con **ULCIUM®** puede haber la aparición de dolores de cabeza o dolor abdominal. Si alguno de estos efectos persiste por más de unos pocos días o empeora, consulte con su médico.

Informe a su médico de forma inmediata si usted experimenta cualquier efecto adverso grave, incluyendo taquicardia o bradicardia, espasmos musculares persistentes o convulsiones, que pueden ser signos de una disminución importante de los niveles de magnesio en la sangre.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Antes de iniciar su tratamiento con **ULCIUM®** informe a su médico si está tomando cualquier otra medicación. Entre los productos que pueden interactuar con el esomeprazol están el clopidogrel, metrotexate, nelfinavir, rifampicina, hierba de San Juan.

Algunos productos necesitan de la presencia de ácido en el estómago para poder ser bien absorbidos. El esomeprazol, al reducir la cantidad de ácido estomacal, puede afectar la absorción de ciertos medicamentos, incluyendo digoxina, suplementos de hierro y ketoconazol, entre otros.

CONSEJOS DE USO

Tome **ULCIUM®** de acuerdo a la instrucciones de su médico, usualmente una vez al día, por lo menos una hora antes de las comidas. Ingiera la cápsula entera con

algo de líquido, sin masticarla ni romperla. Tome su dosis a la misma hora todos los días.

Si usted está tomando también medicamentos con sucralfato, tome el **ULCIUM®** por lo menos 30 minutos antes del sucralfato.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda de forma urgente al centro de salud más cercano. Los síntomas de una sobredosis con esomeprazol son variables, pero pueden incluir confusión, mareos, visión borrosa, taquicardia y náuseas.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

PRESENTACIONES

ULCIUM® 20 mg, caja por 12 cápsulas.

ULCIUM® 40 mg, caja por 12 cápsulas.

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Julio 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com