UROFLOX®

Levofloxacino
Tabletas Recubiertas de 500 mg y 750 mg

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Uroflox tabletas recubiertas 500 mg

Cada tableta recubierta contiene hemihidrato de levofloxacino equivalente a 500 mg de levofloxacino base.

Excipientes: Hipromelosa, celulosa microcristalina PH 102, almidón pregelatinizado, croscamelosa sodica, dióxido de silicio, Estereato magnesio, alcohol etílico, Cubierta: Opadry blanco, agua purificada, alcohol etilico.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

Uroflox tabletas recubiertas 750 mg

Cada tableta recubierta contiene hemihidrato de levofloxacino equivalente a 750 mg de levofloxacino base.

Excipientes: Hipromelosa, celulosa microcristalina PH 102, almidón pregelatinizado, croscaramelosa, sódica, dióxido de silicio, estearato de magnesio, alcohol etílico*. Cubierta opadry blanco, colorante rojo FD& C N° 40, agua purificada*, alcohol etílico*.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

CLASE TERAPÉUTICA

Antibacteriano fluroquinolónico.

DESCRIPCIÓN

UROFLOX contiene como principio activo al levofloxacino, un antibiótico perteneciente a la familia de las fluoroquinolonas, indicado para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias susceptibles en pacientes mayores de 18 años de edad.

INDICACIONES, DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Su médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso. En general, las indicaciones recomendadas y las dosis usuales para estas indicaciones son las siguientes:

- Neumonía leve: 500 mg al día por 7-14 días, o 750 mg al día por 5 días.
- Neumonía hospitalaria: 750 mg al día por 7-14 días.
- Sinusitis bacteriana aguda: 500 mg al día por 10-14 días, o 750 mg al día por 5 días.
- Exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica: 500 mg al día por mínimo 7 días.
- Infecciones de la piel: 750 mg al día por 7-14 días.
- Prostatitis bacteriana crónica: 500 mg al día por 28 días.
- Infecciones no complicadas de las vías urinarias: 500 mg al día por 3 días.
- Pielonefritis: 750 mg al día por 5 días.

En los pacientes con disminución de la función renal, la dosis se modifica de acuerdo a las instrucciones del médico.

CONTRAINDICACIONES

No use este producto si usted tiene antecedentes de alergia a la levofloxacino o a cualquier otro antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas.

ADVERTENCIAS

En raros casos, los antibióticos fluoroquinolónicos pueden causar daños en los tendones (tales como tendinitis y ruptura de los tendones), principalmente en pacientes de más de 60 años, pacientes que están tomando corticoesteroides, o pacientes que han recibido transplantes de órganos. Si usted presenta dolor o hinchazón en los tendones, músculos o articulaciones, suspenda el tratamiento con UROFLOX y consulte inmediatamente con su médico.

Este medicamento no debe ser utilizado por pacientes con miastenia grave. Acuda al médico si usted presenta debilidad muscular o dificultad para respirar durante el tratamiento con UROFLOX.

PRECAUCIONES DE USO
Antes de iniciar el tratamiento con UROFLOX informe a su médico si usted tiene alguna alergia o cualquier otro problema de salud, especialmente si usted sufre alguna de las siguientes condiciones: diabetes, miastenia grave, arritmias cardiacas, problemas en los tendones o las articulaciones, enfermedades hepáticas o renales, enfermedades del sistema nervioso central, epilepsia o condiciones que aumenten el riesgo de convulsiones, enfermedades musculares o dificultad para respirar, niveles bajos de potasio sérico (hipokalemia), o antecedentes personales o familiares de una condición llamada "prolongación del intervalo QT".
Uso en el embarazo y la lactancia: UROFLOX no debe ser usado por mujeres embarazadas, salvo casos muy excepcionales determinados por el médico.
El levofloxacino es excretado por la leche materna y por lo general no debe ser administrado a mujeres dando de lactar.
Uso en Pediatría: UROFLOX tabletas no está indicado para menores de 18 años de edad.
Precauciones especiales: El levofloxacino puede en ocasiones producir somnolencia o mareos. No conduzca ni realice actividades que requieren de un gran nivel de alerta hasta que esté seguro de que usted puede llevar a cabo estas actividades con seguridad.

EFECTOS ADVERSOS
En ocasiones, durante el tratamiento con UROFLOX puede haber la aparición de náuseas, dolores de cabeza, mareos o problemas para dormir. Si cualquiera de estos efectos persiste por más de unos pocos días o empeora, consulte con su médico.
Informe a su médico de forma inmediata si ocurre alguno de los siguientes efectos adversos: sangrado, fiebre persistente, cambios en el volumen o el color de la orina, dolor de pecho, dolor de cabeza severo, visión borrosa, convulsiones, mareo severo, nerviosismo, confusión, hormigueos o adormecimiento de alguna parte del cuerpo, cansancio excesivo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No tome las tabletas de UROFLOX conjuntamente con antiácidos, sucralfate, suplementos de hierro o multivitamínicos que contengan zinc, porque estos productos pueden interferir con la adecuada absorción del levofloxacino. Estos agentes deben tomarse por lo menos dos horas antes o dos horas después de la administración de UROFLOX.
El uso de levofloxacino puede interferir con la acción de los antidiabéticos orales. Su médico puede indicarle la necesidad de llevar a cabo un control más estrecho de su glicemia durante el tiempo que dure el tratamiento.
No es recomendable el uso de antiinflamatorios no esteroidales, tales como el naproxeno o el ibuprofeno, en conjunto con antibióticos fluoquinolónicos, incluyendo el levofloxacino. Puede existir un incremento del riesgo de efectos adversos del sistema nervioso central y convulsiones.

CONSEJOS DE USO
Las tabletas de UROFLOX se administran por lo general una vez al día, con un vaso lleno de agua, de preferencia todos los días a la misma hora. Tome bastantes líquidos durante el tratamiento con UROFLOX, salvo recomendación en contrario de su médico.
El levofloxacino puede incrementar su sensibilidad a los rayos del sol. Evite exponerse al sol por mucho tiempo.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis, se debe acudir de forma urgente al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis se encuentra el mareo severo.

ALMACENAMIENTO
Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración: Oral

PRESENTACIONES
UROFLOX 500 mg tabletas recubiertas,
caja por 14
UROFLOX 750 mg tabletas recubiertas,
caja por 14

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por
Laboratorios Rocnarf, S.A.
Av. Juan Tanca Marengo Km 5½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto: Julio del 2021

Rocnarf
Experiencia y Compromiso en Medicamentos de Calidad
www.rocnarf.com

Rev. 01