

# XANIT®

## Policresuleno 100 mg, cinchocaína 2,5 mg Supositorios rectales

### FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

### COMPOSICIÓN:

Cada supositorio rectal contiene 2,5 mg de cinchocaína y 100 mg de policresuleno.  
Excipientes: polietilenglicol 1450, polietilenglicol 3350.

### CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA

Antihemorroidal de uso tópico.

### DESCRIPCIÓN

El policresuleno tiene una acción hemostática dada por su capacidad para coagular las proteínas del plasma y contraer el músculo liso de los vasos sanguíneos, facilitando la reepitelización de la zona afectada. Adicionalmente, su pH ácido le confiere efectos antimicrobianos, impidiendo la proliferación bacteriana en el área afectada. La cinchocaína tiene un efecto anestésico local que ayuda a aliviar el dolor y la picazón.

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Hemorroides internas o externas, proctitis, fisuras anales, eczema anal, manejo postquirúrgico de las heridas anorrectales.

### CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

### PRECAUCIONES

**Precauciones generales:** XANIT es un medicamento de acción local que no contiene esteroides, y sus principios activos no se absorben hacia la

circulación general o lo hacen en cantidades no significativas. No se dispone de datos para precauciones especiales de uso cuando se administra siguiendo las instrucciones de este folleto y las indicaciones de su médico.

Evite el contacto de este medicamento con los ojos o la mucosa oral.

**Uso durante el embarazo y la lactancia:** No se dispone de datos acerca de la seguridad y eficacia de este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Por tanto, su administración a mujeres embarazadas o dando de lactar debe hacerse únicamente por prescripción y bajo vigilancia médica.

**Uso en pediatría:** Consulte con médico pediatra antes de aplicar este producto a niños menores de 12 años.

**Uso en geriatría:** No existen precauciones específicas de uso para pacientes ancianos.

**Precauciones especiales de uso:** No se han reportado efectos de la aplicación rectal de los principios activos de XANIT sobre la capacidad de conducir u operar maquinaria peligrosa.

## **INTERACCIONES FARMACOLOGICAS**

No se dispone de datos acerca de interacciones específicas entre los componentes de XANIT y otros medicamentos. Informe siempre a su médico acerca de cualquier medicamento o producto natural que usted esté utilizando.

## **EFFECTOS ADVERSOS**

XANIT es un medicamento por lo general bien tolerado. En ciertos casos su uso puede acompañarse de sensación temporal de ardor o picazón en el área de aplicación, especialmente al inicio del tratamiento. Consulte a su médico en caso de que estas o cualquier otra molestia se mantengan o empeoren con el paso de los días.

## **DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACION**

En adultos la dosis recomendada es de un supositorio dos a tres veces al día, aplicado por vía rectal después de las deposiciones.

Luego del cese de los síntomas, el tratamiento con XANIT puede mantenerse con un supositorio al día.

## **SOBREDOSIS**

No se dispone de información referente a la sobredosis con este producto.

## **ALMACENAMIENTO**

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN: RECTAL.**

## **PRESENTACIONES**

XANIT (Supositorios rectales), caja por x 6 supositorios rectales.

Venta Bajo Receta Médica

## **Elaborado por**

**Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Merengo, km 5.5  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto: Julio del 2021

