

HAPECO® Gotas

Multivitamínico Pediátrico

Solución oral para gotas

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN

Cada ml de la Solución Oral contiene:

Vitamina A Palmitato (1 millón UI/g)	3 mg
Vitamina B ₁ (Clorhidrato de tiamina)	2 mg
Vitamina B ₂ (Riboflavina 5 fosfato sodio)	1,5 mg
Vitamina B ₅ (D-Pantenol)	10 mg
Vitamina B ₆ (Clorhidrato de piridoxina)	2 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico)	80 mg
Vitamina D ₃ (Colecalciferol)	0,9 mg
Vitamina E (Alfa tocoferol acetato)	15 mg
Vitamina H (D-Biotina)	0.2 mg
Nicotinamida	15 mg
Fluoruro de Sodio (Equivalentes a 0,5 mg de ión fluor)	1,116 mg

Excipientes: Butilhidroxitolueno, macrogolglicerol hidroestearato, sacarosa, metilparabeno, sorbato de potasio, ácido cítrico, glicerina, sorbitol, propilenglicol, sabor chicle, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Multivitamínico con flúor

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

HAPECO® gotas contiene una fórmula multivitamínica completa, que incluye diez vitaminas más fluoruro de sodio, en concentraciones adecuadas para lactantes y niños hasta los 12 años de edad.

INDICACIONES

Como suplemento multivitamínico, **HAPECO® gotas** está indicado para la prevención de estados de carencia vitamínica y como apoyo en el crecimiento y desarrollo físico y mental de lactantes y niños.

CONTRAINDICACIONES

- Antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Hipervitaminosis A o D, o administración simultánea de otros compuestos que contengan vitaminas A, D o E
- Insuficiencia renal

PRECAUCIONES

HAPECO® gotas contiene vitaminas liposolubles que si se administran a dosis excesivas e inapropiadas pueden acumularse en el organismo y producir efectos tóxicos por hipervitaminosis. No administre más de la dosis indicada por el médico.

Uso en el embarazo y la lactancia: **HAPECO® gotas** no está indicado para mujeres embarazadas o dando de lactar.

EFECTOS ADVERSOS

HAPECO® gotas suele ser muy bien tolerado por los lactantes y niños, y su administración raramente se acompaña de efectos adversos. En ciertas ocasiones puede haber un efecto laxante leve y transitorio, dado por los componentes de la fórmula.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis y el tiempo de tratamiento dependen del criterio del médico.

En la mayoría de las ocasiones, la dosis usualmente recomendada de **HAPECO® gotas** es la siguiente:

Edad	En la Prevención de la Hipovitaminosis	En Estados de Hipovitaminosis
Niños menores de 6 años	6 gotas 1 vez al día	6 gotas 2 veces al día
Niños de 6 a 12 años	12 gotas 1 vez al día	12 gotas 2 veces al día

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

Entre los síntomas de una intoxicación aguda por los componentes de **HAPECO® gotas** se encuentran el dolor de cabeza, cansancio, vértigos, náuseas, vómitos, falta de apetito, somnolencia, diarreas y calambres intestinales.

CONSEJOS DE USO

Las gotas de **HAPECO®** pueden administrarse solas o disueltas en jugos de frutas.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

PRESENTACIÓN

HAPECO® Solución para gotas orales, frasco gotero por 30 ml.

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:

Julio del 2021



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com

Rev. 01