

GLICO-LAX®

Polietilenglicol

Sobres

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Glico-Lax Sobres

Cada sobre contiene 17 g de polietilenglicol.

GRUPO TERAPÉUTICO

Laxante osmótico.

DESCRIPCIÓN

GLICO-LAX® contiene como principio activo Polietilenglicol. El tamaño de sus moléculas impide que se absorban a través de la mucosa intestinal, de modo que permanecen retenidas en el lumen digestivo, donde por su poder osmótico, induce la retención de agua por la materia fecal, con lo cual ésta aumenta su volumen, reblandeciendo su consistencia y facilitando su eliminación.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático del estreñimiento.

CONTRAINDICACIONES

No está indicado en pacientes que presenten hipersensibilidad al polietilenglicol. Pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal. Igualmente debe evitarse su administración en pacientes con dolores abdominales de etiología no determinada.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los pacientes que presenten síntomas que pueden sugerir un abdomen agudo obstructivo o inflamatorio (náuseas, vómitos, dolor y

distensión abdominal, disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos, fiebre, náusea y otros), deben ser evaluados cuidadosamente para descartar estas condiciones antes de recibir la terapia.

Uso durante el embarazo: No se ha establecido la seguridad del polietilenglicol durante el embarazo. Este medicamento debe administrarse durante el embarazo solo bajo estricta supervisión médica y únicamente en aquellos casos en los que los beneficios esperados superen claramente los riesgos potenciales.

Uso durante la lactancia: No se recomienda la administración de GLICO-LAX® a mujeres dando de lactar.

Uso en pediatría: Su uso no está indicado en menores de 16 años de edad.

Uso en geriatría: Los estudios adecuados realizados hasta la fecha no han evidenciado reacciones adversas específicas en este grupo de edad.

Precauciones especiales: El uso frecuente, prolongado o excesivo de GLICO-LAX®, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes. La acción de los laxantes en pacientes con historia de constipación crónica puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

GLICO-LAX® no ha demostrado tener interacciones con otros medicamentos.

EFECTOS ADVERSOS

Puede presentar náusea, dolor y distensión abdominal, meteorismo y flatulencia. Las dosis altas pueden producir diarrea y un mayor número de evacuaciones. Comuníquese con su médico ante cualquier molestia que no ceda o que empeore con el paso de los días.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis recomendada es la siguiente:

Adultos: Un sobre de 17 g en polvo por día como máximo.

En pacientes con historia de estreñimiento, el efecto puede no ser inmediato y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal.

Se sugiere no aumentar la dosis diaria ni la frecuencia de la administración, deberá esperarse la respuesta en un tiempo máximo de 72 horas.

SOBREDOSIS

Ante cualquier sospecha de sobredosis acuda al centro de salud más cercano. Una sobredosis con este medicamento puede presentarse con síntomas y signos tales como diarrea y deshidratación debida a la diarrea, en estos casos se debe administrar líquidos suficientes.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración: Oral

PRESENTACIÓN

GLICO-LAX® sobres, Caja x 7 sobres, Caja x 10 sobres, Caja x 20 sobres

Venta Libre

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión:

Mayo del 2022



Rocnarf

Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com