

Nistat[®] Crema 100.000 UI/g

Nistatina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Nistat Crema

Cada 100 g contienen:

Nistatina..... 2.272 g

Excipientes: Oxido de zinc, Crodabase SQ, Lanolina USP.

GRUPO TERAPÉUTICO

Antimicótico.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Nistat crema 100.000 UI/g es un medicamento antimicótico utilizado para el tratamiento de las infecciones cutáneas y mucocutáneas causadas por hongos de la especie candida (monillas).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a la Nistatina o algunos de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES DE USO

Para el tratamiento tópico, debe tener la precaución de evitar el contacto de la crema con los ojos y no utilizar vendaje que no permita transpirar a la zona afectada. Si después de dos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Advertencia de uso durante el embarazo, lactancia y otros:

Uso durante el embarazo: Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas es poco probable que dañe al feto.

Uso durante la lactancia: Este medicamento puede ser absorbido (aunque en pequeñas cantidades) por la piel por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

Uso en pediatría: el uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta con su pediatra.

Uso geriátrico: No existen recomendaciones especiales para los ancianos.

Capacidad para conducir y utilizar máquinas: Es poco probable que el medicamento afecte la capacidad de concentración y el estado de alerta.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se dispone de información acerca de interacciones de la nistatina con otros medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS

Los efectos adversos de este medicamento son generalmente leves y transitorios. Ocasionalmente: alteraciones alérgicas/dermatológicas, eritema, prurito, sensación de quemazón. Raramente: Dermatitis por contacto. El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente en el caso que la paciente experimente algún episodio de irritación y/o hipersensibilidad. Si estas o cualquier otra molestia persisten o empeoran con el paso de los días consulte a su médico.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, se recomienda:

- Aplicar la crema dos veces al día en la zona afectada.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

Debe aplicar asegurándose de cubrir toda la zona afectada. No debe utilizar vendajes que no permitan transpirar a la zona de infección.

Debe usarlo solamente durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Se recomienda que prolongue el tratamiento 2 a 3 días luego que desaparezcan los síntomas para evitar recaídas posteriores.

SOBREDOSIS

En el caso de sobredosis o ingestión accidental, interrumpir el tratamiento e instaurar la terapia sintomática adecuada.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, a una temperatura no mayor de 30°C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Nistat crema, caja/tubo x 30 g

Venta Bajo Receta Médica.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este prospecto: noviembre del 2022

