

VAGIRAL®

Clotrimazol

Supositorios Vaginales

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este prospecto antes de administrar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada supositorio vaginal contiene:

Cotrimazol 200 mg

Excipientes: Metilparabeno, witepsol w-35

GRUPO TERAPÉUTICO

Antimicótico vaginal.

DESCRIPCIÓN

VAGIRAL® contiene como principio activo clotrimazol, un medicamento antimicótico que actúa por inhibición de la síntesis del ergosterol fúngico. Aplicado por vía vaginal, el clotrimazol ha demostrado ser altamente eficaz en el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal, una infección causada por el hongo *Candida albicans* y otras especies de candidas.

INDICACIONES

Tratamiento de la candidiasis vulvovaginal.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Su médico le indicará la dosis y el tiempo de tratamiento indicados para su caso. En general, la dosis usualmente recomendada de VAGIRAL® es de un supositorio intravaginal profundo aplicado en la noche, por tres noches consecutivas.

CONTRAINDICACIONES

No use este medicamento si usted tiene antecedentes de alergia al clotrimazol.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han reportado interacciones clínicamente significativas del clotrimazol aplicado por vía vaginal con otros medicamentos.

ADVERTENCIAS

Antes de usar este medicamento, comunique a su médico si usted es alérgica al clotrimazol o cualquier otro antimicótico azólico (como terconazol o fluconazol), o si usted tiene algún otro tipo de alergia o condición médica.

Uso en el embarazo y en pediatría: El uso de VAGIRAL® durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, debe hacerse exclusivamente bajo indicación y supervisión de su médico. VAGIRAL® no está indicado para pacientes menores de 12 años.

EFFECTOS ADVERSOS

VAGIRAL® suele ser bien tolerado por la mayoría de las pacientes. En raras ocasiones pueden ocurrir molestias tales como irritación, ardor, picazón o secreción vaginal durante el tratamiento. Si estas o cualquier molestia se mantienen o empeoran con el paso de los días, comuníquelo a su médico. En caso de presentar síntomas o signos de alergia, tales como enrojecimiento o ronchas en la piel, suspenda el tratamiento y acuda a su médico.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

CONSEJOS DE USO

Aplicarse el supositorio intravaginal profundo, de preferencia en la noche antes de acostarse.

El clotrimazol puede disminuir temporalmente la efectividad de los métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo o el diafragma. Se recomienda usar métodos anticonceptivos alternativos o abstenerse de mantener relaciones sexuales durante el tratamiento.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VAGINAL

PRESENTACIONES

VAGIRAL® Supositorios Vaginales, caja x 12

Venta Libre

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este
Prospecto: Marzo del 2025



Rocnarf

www.rocnarf.com