

MUCOXIN® Junior

MUCOXIN® Relax

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este prospecto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN

MUCOXIN® Junior

Cada 5 ml del jarabe contienen 15 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.

Excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, ácido cítrico anhidro, glicerina, sorbitol, sacarosa, esencia de cereza, color rojo FD&C 40, agua purificada.

MUCOXIN® Relax

Cada 5 ml del jarabe contienen 30 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.

Excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, ácido cítrico anhidro, glicerina, sorbitol, sacarosa, esencia de banano líquida, agua purificada.

Cada tableta contiene 30 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.

Excipientes: almidón de maíz, lactosa, estearato de magnesio.

GRUPO TERAPÉUTICO

Mucolítico, antihistamínico

DESCRIPCIÓN

MUCOXIN® RELAX y MUCOXIN® JUNIOR contienen como principios activos ambroxol y loratadina. La loratadina es un fármaco antihistamínico H1 no sedante, muy eficaz para el alivio de la congestión nasal, la rinorrea, el lagrimeo y los estornudos.

INDICACIONES CLÍNICAS

MUCOXIN® RELAX, MUCOXIN® JUNIOR:

Coadyuvantes en el tratamiento de afecciones respiratorias altas acompañadas de congestión nasal, estornudos, tos y mocosidad respiratoria espesa e irritativa, incluyendo resfriado común, rinitis alérgica, bronquitis, faringitis, sinusitis aguda y asma bronquial.

CONTRAINDICACIONES

MUCOXIN® RELAX, MUCOXIN® JUNIOR:

Antecedentes de alergia al ambroxol o a la loratadina.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento informe a su médico acerca de cualquier condición médica o alergias que usted tenga o haya tenido. El

ambroxol debe administrarse con precaución a pacientes con úlcera péptica activa o antecedentes de úlcera.

Uso durante el embarazo o la lactancia: Si usted está embarazada o dando de lactar, consulte a su médico antes de tomar cualquiera de los medicamentos descritos en este inserto.

Uso en Pediatría: MUCOXIN® JUNIOR Y MUCOXIN® RELAX, están indicados solo para niños mayores de 2 años de edad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comunique a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, incluso aquellos que no requieran receta médica.

EFFECTOS ADVERSOS

En raras ocasiones pueden producirse molestias tales como dolor de cabeza, somnolencia, dolor abdominal o diarreas, por lo general leves y autolimitadas.

Si estas o alguna otra molestia no cesan o empeoran con el paso de los días, o si usted experimenta cualquier reacción alérgica tales como ronchas en la piel, picazón o dificultad para respirar, consulte prontamente con su médico.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis y el tiempo de tratamiento dependen de su condición específica y el criterio de su médico. Las dosis recomendadas son las siguientes:

MUCOXIN® JUNIOR JARABE

- Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cucharadita) dos veces al día.
- Niños de 6 a 12 años: 5 ml (una cucharadita) dos veces al día.

MUCOXIN® RELAX JARABE

- Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cucharadita) dos veces al día.
- Mayores de 6 años y adultos: 5 ml (una cucharadita) dos veces al día.

MUCOXIN® RELAX TABLETAS

- Mayores de 6 años y adultos: una tableta dos veces al día.

SOBREDOSIS

En caso de una sobredosis, acuda al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis con loratadina se encuentran el dolor de cabeza, las palpitaciones y la somnolencia.

ALMACENAMIENTO

Conserve este medicamento en su envase original, a una temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz y la humedad y lejos del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

PRESENTACIONES

MUCOXIN® JUNIOR Jarabe, frasco por 120 ml y 200 ml.

MUCOXIN® RELAX Jarabe, frasco por 120 ml y 200 ml.

MUCOXIN® RELAX Tabletas, caja por 30

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Enero del 2025



www.rocnarf.com