

CLINDACIN® CLINDACIN K®

Supositorios vaginales

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de administrar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

CLINDACIN®

Cada supositorio vaginal contiene:
Clindamicina fosfato 118.0 mg
(equivalentes a 100 mg de clindamicina).

Excipientes: Metilparabeno, Witepsol

CLINDACIN® K

Cada supositorio vaginal contiene:
Clindamicina fosfato 118.82 mg
(equivalentes a 100 mg de clindamicina).
Ketoconazol 400.0 mg
Excipientes: Metilparabeno, Witepsol W 35

GRUPO TERAPÉUTICO

Antibacteriano y antimicótico vaginal.

DESCRIPCIÓN

CLINDACIN® contiene como principio activo clindamicina, un agente antibacteriano eficaz en el tratamiento de determinados tipos de infecciones vaginales causadas por bacterias.

CLINDACIN® K contiene una combinación de clindamicina y ketoconazol. El ketoconazol es un agente antimicótico de amplio espectro utilizado para el tratamiento de infecciones vaginales causadas por hongos.

INDICACIONES CLÍNICAS

CLINDACIN®: Tratamiento de la vaginosis bacteriana simple.

CLINDACIN® K: Tratamiento de las vaginitis mixtas, con presencia simultánea de vaginosis bacteriana y candidiasis vulvo-vaginal

CONTRAINDICACIONES

No utilice este medicamento si usted tiene antecedentes de hipersensibilidad a la clindamicina, a la lincomicina o al ketoconazol.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento, informe a su médico acerca de cualquier alergia o condición médica que usted tenga o haya tenido. CLINDACIN® K no está indicado durante el primer trimestre del embarazo, excepto en aquellos casos en los que los beneficios esperados sean mayores a los riesgos potenciales. Si usted está embarazada o dando de lactar, consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuníquese a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando, incluso aquellos que no requieran receta médica.

EFFECTOS ADVERSOS

En algunas ocasiones pueden darse molestias locales tales como secreción y ardor o dolor vaginal, por lo general leves y transitorias. Muy raramente se presentan efectos secundarios a nivel sistémico, principalmente cambios en la menstruación, ardor al orinar, dolores de cabeza, dolor abdominal, diarreas o náuseas. Si usted presenta estas o alguna otra molestia durante su tratamiento, informe a su médico.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Las dosis recomendadas son las siguientes: CLINDACIN®: aplicarse 1 óvulo por vía intravaginal profunda por 3 noches consecutivas en la mujer no embarazada y por 7 noches consecutivas en la mujer embarazada durante el segundo y tercer trimestre del embarazo.

CLINDACIN® K: aplicare 1 óvulo por vía intravaginal profunda por 7 noches consecutivas. CLINDACIN® K puede administrarse bajo el mismo esquema durante el segundo y tercer trimestre del embarazo en aquellos casos que los beneficios esperados sean mayores a los riesgos potenciales.

CONSEJOS DE USO

Aplíquese el suppositorio vaginal de CLINDACIN® o CLINDACIN® K por vía intravaginal profunda, de preferencia en la noche antes de acostarse.

El uso de estos supositorios puede disminuir la efectividad de los anticonceptivos de barrera con látex, tales como preservativos o diafragmas. Se recomienda esperar al menos tres días después del tratamiento antes de retomar su uso.

Este medicamento es de uso exclusivamente por vía vaginal. No ingerir.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis acudir al centro de salud más cercano.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C. protegido de la luz y la humedad, lejos del alcance de los

niños. Mantener en su envase original. No utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración: Vaginal

PRESENTACIONES

CLINDACIN®

Supositorios Vaginales, caja por 3

CLINDACIN®

Supositorios Vaginales, caja por 7

CLINDACIN® K

Supositorios Vaginales, caja por 7

Venta Bajo Receta Médica.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo, Km 5½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Marzo del 2025



www.rocnarf.com